

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ビタミンEC主薬製剤

第3類医薬品

天然型ビタミンE・ビタミンC・ビタミンB2・ビタミンB6配合

ビトン-ハイ[®] リッチ

ビトン-ハイ リッチの特徴

- 主薬である天然型ビタミンEは、抗酸化作用により、血行に障害を与える過酸化脂質の生成を抑え、血行を良くします。また、血液の流れをスムーズにして、肩・首すじのこり、手足の冷えやしびれを緩和します。
- 主薬であるビタミンCは、皮膚や粘膜の正常な働きを助けるとともに抗酸化作用を持っています。肌のはりと潤いに必要なコラーゲンの生成に欠かせない成分であり、日焼け、しみの原因となるメラニン色素の沈着を防ぎます。
- ビタミンB2は、脂肪の代謝に関与し、エネルギー産生に欠かせない成分です。ビタミンE・Cの働きを助けます。
- ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の正常な働きを助けます。
- 3包(1包2g)中にビタミンC 2000mg、ビタミンE 300mgが含まれています。
- 口の中ですぐに溶ける味の良い、シュガーフリー(砂糖を含まない)、ナトリウムフリー(塩分を含まない)の服用しやすい分包顆粒剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
医師の治療を受けている人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、胃部不快感
- (2)1カ月位服用しても症状がよくなる場合
3. 生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師又は薬剤師に相談して下さい
4. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい
便秘、下痢

■ 効能・効果

- 次の諸症状の緩和：
しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着
- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：
肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 次の場合の出血予防：
歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談して下さい」

- 次の場合のビタミンECの補給：
肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

■ 用法・用量

年齢	1回服用量	1日服用回数
15歳以上	1包	1～3回 (ただし、1日2回服用する場合は朝食及び夕食後、1日3回服用する場合は毎食後服用して下さい)
11歳以上 15歳未満	2/3包	
7歳以上 11歳未満	1/2包	
3歳以上 7歳未満	1/3包	
1歳以上 3歳未満	1/4包	
1歳未満	服用しないで下さい	

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 用法・用量を厳守して下さい。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

■ 成分・分量

本剤は、3包(1包2g)中に次の成分を含有しています。

成分	含量(3包中)
アスコルビン酸(ビタミンC)	2000mg
酢酸 <i>d</i> - α -トコフェロール(天然型ビタミンE)	300mg
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB ₂ 酪酸エステル)	12mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	15mg

添加物：還元麦芽糖水アメ、ヒドロキシプロピルセルロース、アセスルファムカリウム、タウマチン、レモン油、香料、トコフェロール

〈成分・分量に関連する注意〉

1. 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合、ビタミンEC製剤を服用していることを医師にお知らせ下さい。
2. 本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。これは本剤に含まれるリボフラビン酪酸エステル(ビタミンB₂酪酸エステル)によるものです。

■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
4. 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
5. 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

電話 03 (6667) 3232

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ビトン-ハイについて詳しくは <http://www.viton.jp/>

01

®登録商標：ビトン-ハイ及びリッチは第一三共ヘルスケアの登録商標です

 販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋小網町1-8

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

製造販売元
日野薬品工業株式会社
滋賀県蒲生郡日野町上野田119