

第3類医薬品

錠剤タイプ 便秘治療薬



水酸化マグネシウム
配合

Laxative for constipation
(Tablet)

ROHTO
ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

お客さま安心サポートデスク

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230
受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、他の瀉下薬(下剤)を服用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) はげしい腹痛、吐き気・嘔吐のある人
 - (4) 腎臓病の診断を受けた人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このボトルを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 消化器:はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
3. 服用後、下痢があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、このボトルを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 1週間位服用しても症状がよくなるしない場合は服用を中止し、このボトルを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

【用法・用量】

次の量を就寝前(又は空腹時)に服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2~6錠	1回
11~14才	1~4錠	
7~10才	1~3錠	
5~6才	1~2錠	
5才未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を厳守すること
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- (3) 本剤は5才未満の乳幼児に服用させないこと

服用の際には、コップ1~2杯の水と共に服用し、なるべく水分を多く摂取するとより効果的です。

【販売名】錠剤ミルマグLX

【成分】1錠中

水酸化マグネシウム0.35g含有
添加物としてトウモロコシデンプン、白糖、タルク、香料含有

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること(2) 小児の手の届かない所に保管すること(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) 錠剤が軟らかいので割れることがある(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後はなるべく早く使用すること(6) ボトルの中の詰め物は、輸送中の錠剤破損防止用である。開封後は不要となるので捨てること