

この説明文書はお薬とともに保管し、使用の際にはよくお読み下さい。

◎必ず、お子様の手の届かないところに、このお薬を保管してください。

Ⓐ

**オゾこどもせきどめシロップ 第②類医薬品
せき／たん**

⚠ 使用上の注意

(本剤は小児用ですが、鎮咳去痰薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。)

ⓧ してはいけないこと

① 次の人は服用しないで下さい

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい

(眼鏡等があらわれることがあります。)



相談すること

① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- ①医師の治療を受けている人。
- ②妊娠又は妊娠していると思われる人。
- ③授乳中の人は。
- ④高齢者。
- ⑤薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ⑥次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- ⑦次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、腎内障、甲状腺機能障害

② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ、息切れ
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

③ 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

口のかわき、眼鏡

④ 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

(裏面もお読みください。)

品名	オゾこどもせきどめシロップ添付文書	制作日	MC	スミアミ				トラップ
本コード		2023.3.20	N					()
校	作業者印	色調						角度
仮コード	0113A03157621	初校	稻生	○	○	○	○	↙
			朝日印刷株式会社	u33d8	APP.TB			

用法・用量

1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用して下さい。なお、場合により約4時間毎に1日6回まで服用することができます。

年齢	1回量	服用回数
11歳以上 15歳未満	10mL	1日3回
8歳以上 11歳未満	7.5mL	
5歳以上 8歳未満	5mL	
3歳以上 5歳未満	3.5mL	
1歳以上 3歳未満	3mL	
3ヶ月以上 1歳未満	1.5mL	
3ヶ月未満	服用しない	


〈用法及び用量に関する注意〉

- ① 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- ② 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。
- ③ 過量服用等に注意し、用法・用量を厳守して下さい。
◎添付の目盛付きコップで量り、使用のつどよく洗い、本剤とともに清潔に保管して下さい。

お子さまの誤飲を防ぐ 安全キャップの使い方

●開け方

- ① テーブル等平らな所に置き、キャップを下に強く押しながら
- ② 矢印の方向に回して開けてください。



●閉め方

- びんの口の周囲をよくふいてから、キャップをしっかりと閉めてください。

※キャップを押さずに回すとカチカチと音がして空回ります。

効能・効果

せき, たん



本品の成分・分量と作用

成 分	分量(60mL)中	作 用
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	40mg	せきをしのぎ、呼吸を楽にします。
d L-メチルエフェドリン塩酸塩	37.5mg	気管支をひろげ、せきをしのぎます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	8mg	アレルギー性のせきをしのぎます。
セネガ流エキス (原生葉換算量400mg)	0.4mL	気道粘膜の分泌を亢進させ、たんをうそくし、出しやすくします。

添加物として、白糖、果糖、D-ソルビトール液、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、ブチルパラベン、安息香酸ナトリウム、エチルアルコール、プロピレンギリコール、カラメル、バニリン、香料

保管及び取扱い上の注意

- ① 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- ② 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- ③ 他の容器に入れ替えないで下さい
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④ 服用のつど瓶の口の周囲を清潔に拭いてからキャップをしめて下さい。
- ⑤ 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- ⑥ 一度フタを開いた後は、使用期限内でも、なるべく長期間の使用はしないで下さい。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は
下記にお願い致します。

明治薬品株式会社 お客様相談室

電話 : 0120-53-3451

受付時間 : 9:00~17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

製造販売元
明治薬品株式会社

富山県富山市三郷6番地

品名	オゾこどもせきどめシロップ 添付文書	制作日		MC (N)	色 スミアミ						トラップ ()	
		2023.3.20	校			調						
本コード			初校	稻生	○	○	○	○	○	○	○	角度
仮コード	0113A03157621			朝日印刷株式会社	u33d8	APP.TB						△△△△