

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痛消炎薬 **ロキソニンS温感テープL** 第2類医薬品

特
徴

すぐれた鎮痛消炎効果をもつ【ロキソプロフェンナトリウム水和物】を配合。

さらに温感成分を追加配合。心地よい温感作用で
患部の血行を促進し、痛みをやわらげます。

1日1回使用。貼り心地がよく、すぐれた
伸縮性ではがれにくく、貼りなおしやすい。

広範囲な部位に使いやすい、
大判サイズ。



使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないで下さい。
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用して
ぜんそくを起こしたことがある人
 - 15歳未満の小児
- 次の部位には使用しないで下さい。
 - 目の周囲、粘膜等
 - しっしん、かぶれ、傷口
 - みずむし・たむし等又は化膿している患部
- 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないで下さい。
- 連続して2週間以上使用しないで下さい。(本剤は痛みを一時的におさ
えるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師
の診療を受けて下さい)



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 高齢者
 - 次の診断を受けた人 気管支ぜんそく

- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに
使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、 青あざができる、色素沈着
消 化 器	胃部不快感、みぞおちの痛み
そ の 他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の
診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声の かすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、 動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状
の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この外箱を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。下痢・軟便
- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、
この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(他の疾患の可能性がります)

用法・用量

表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付して下さい。
<用法・用量に関連する注意> (1)用法・用量を厳守して下さい。(2)本剤は、痛み
やはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状
のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用して下さい。(3)1日あたり
2枚を超えて使用しないで下さい。(4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、
よく拭きとってから使用して下さい。(5)貼った患部をコタツや電気毛布等で
温めないで下さい。(6)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、
1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の
症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。

成分・分量(膏体100g中)

成 分	分 量	はたらき
ロキソプロフェン ナトリウム水和物	5.67g (無水物として5g)	炎症や痛みのもと【プロスタグランジン】を おさえます。
ノナン酸バニリル アミド	0.015g	温感作用により、患部の血行を促進し、痛み をやわらげます。

添加物：スチレン・イソプレン・スチレンブロックコポリマー、ポリイソブチレン、水添ロジング
リセリンエステル、BHT、l-メントール、流動パラフィン、その他2成分

[1枚あたり(10cm×14cm)膏体量2g]

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、
肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の
届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因に
なったり品質が変わります)(4)品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋の
チャックをきちんと閉めて保管して下さい。(5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用
しないで下さい。また、アルミ袋を開封した後は、なるべく早く使用して下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
リードケミカル株式会社
富山県富山市日俣77-3

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

MADE IN JAPAN