

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

見られたくないデコルテ湿疹等に かき壊して痕[あと]になる前に



メディロイド VS 軟膏



管理コード
512095A1

第2類医薬品

販売名：クリニラボ メディロイドVS軟膏

〈湿疹・皮膚炎治療薬〉

- ◆クリニラボ メディロイドVS軟膏は、見られたくないデコルテ湿疹等に効く、ストロングランクのステロイド成分を配合した薬です。
- ◆スイッチOTC成分のベタメタゾン吉草酸エステルが、つらい湿疹や皮膚炎をしずめます。
- ◆デコルテ等の擦れやすい患部をびたっと保護する密着バームです。



使用上の注意



❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- ① 次の人は使用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ② 次の部位には使用しないでください
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
(2) 目の周囲、粘膜等。
- ③ 顔面には、広範囲に使用しないでください
- ④ 長期連用しないでください



相談すること



- ① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
- ② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感、白くなる

- ③ 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能


湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日1回～数回、適量を患部に塗布してください。

〔注意〕

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。
- (5)使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。また、おむつのあたる部位に使うときは、ぴったりとしたおむつやビニール製等の密封性のあるパンツは使用しないでください。
- (6)化粧下、ひげそり後等に使用しないでください。



〈チューブの穴の開け方〉

キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててください。

成 分

1g中

成 分	分量	はたらき
ベタメタゾン吉草酸エステル	1.2mg	炎症を元から鎮め、湿疹・かゆみ・皮膚炎を抑えます。

添加物：流動パラフィン、ワセリン

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電 話 03-3985-1800

受付時間 8:30～17:00(土、日、祝日を除く)

※受付時間の詳細は、大正製薬ホームページにてご確認ください

発 売 元

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<https://www.taisho.co.jp/>

製造販売元

ジャパンメディック株式会社

富山県富山市横越168番地

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)