

眼科用剤（分包品）

日本薬局方

第3類医薬品

# ホウ酸

Boric Acid

## 【使用上の注意】



### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 外用にのみ使用し、内服しないでください
2. 長期連用しないでください

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。

はげしい目の痛み

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください

使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

【効 能 効 果】 結膜囊の洗浄・消毒

【用 法 用 量】 2%以下の濃度で用いてください。

### ＜用法用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (3) 眼科用にのみ使用してください。
- (4) 完全に溶解させてから使用してください。
- (5) 混濁したものは使用しないでください。

【成 分 分 量】 1包中 日局ホウ酸 3g含有。

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）

(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

(5) 溶かした後は速やかに使用してください。

### ＜貯法＞

密閉容器。室温保存。

【希 釈 方 法】 2%液：本品1包（3g）をとり、水約150 mLに溶かしてください。

外用剤なので飲まないでください

【包 装】 3g×18包