



解熱鎮痛薬

ねむくならない／頭痛薬

ノーイチS

第②類医薬品

- ねむくならない・・・ノーイチSには、ねむくなる成分が入っておりませんので車の運転中にも、ビジネス中にも服用できます。
- 早く効きます・・・ノーイチSは微粉末の製剤になっていますので、胃の中で早く溶け、早く効きます。
- 胃にソフト・・・ノーイチSには、胃障害の少ない成分が配合されています。

〔⚠ 使用上のご注意〕

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 1.次の方は服用しないでください。
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
- 3.服用前後は飲酒をしないでください。
- 4.長期連用しないでください。

相談すること

- 1.次の方は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15才未満)。
(4)高齢者。
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6)次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合には副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

(➡裏面に続きます)

症状の名称	症 状
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の 広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ (小膿疱) が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、 急激に悪化する
薬剤性過敏症症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、 リンパ節(首、わきの下、股の付け根等)のはれ等があらわれる
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色 尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関 節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息 苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわ れたり、持続したりする
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等が あらわれる

3.5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、
歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり
痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

年齢区分	1回量
15才以上	1包
7才以上15才未満	1/2包
3才以上7才未満	1/3包

左記1回量を1日3回を限度とし、なるべく空腹
時をさけて服用してください。
服用間隔は4時間以上おいてください。

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 用法及び用量をお守りください。
- 3才未満の小児には服用させないでください。

成分・分量

本品1日量(3包)中

1包量0.6g

成 分	分 量	作 用
アセトアミノフェン	450mg	頭痛・歯痛・関節の痛み・発熱等にすばやい効 果があります。
エテンザミド	750mg	
無水カフェイン	240mg	他の成分の働きを助けます。

添加物として、合成ケイ酸Al、リン酸水素Ca水和物、バレイシヨデンブ、メタケイ酸アルミ
ン酸Mg、無水ケイ酸を含有します。

保管・取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
- (4)使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。

消費者ご相談窓口

発売元 **N-1** 薬品株式会社 大阪府松原市高見の里4丁目8番16号
お客様相談室：072-331-0417
受付時間：10時から16時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 株式会社 廣 昌 堂 富山県射水市水戸田2841