

【成分・分量】1日量1本(50mL)  
中 チアミン硝酸化物10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム3mg、ピリドキシン塩酸塩5mg、ニコチン酸アミド12mg、無水カフェイン50mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン30mg、カルニチン塩化物100mg、ゴオウ抽出液100 $\mu$ L(ゴオウ2mgに相当)、ニンジンエキス72.1mg(ニンジン800mgに相当) 添加物：白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、トウガラシチンキ、安息香酸Na、カラメル、エタノール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、香料、l-メントール、グリセリン〔(アルコール0.4mL以下)〕  
●本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがある。

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を服用する。●用法及び用量を厳守すること。●本剤は、まれに沈殿を生じることがある。よく振って服用すること。

副作用被害救済制度

電話：0120-149-931

〈お客様相談室〉06-6203-5151

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

50mL AL01

# 牛黄・人参配合



TAMURA

RIKISEI II

# りき精II

第3類医薬品

製造販売元

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

【使用上の注意】

相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること/皮膚：発疹/消化器：胃部不快感、下痢 2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質

【保管及び取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)加温、冷凍はさけること。

ガラス：瓶

金属：キャップ

使用期限

製造番号



4 904751 201104