

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

しみなくて優しいさし心地 **目薬**

第3類医薬品

こどもロビンアイ<sup>®</sup>プラス

10mL

お子さまの目は、スマホ・タブレットの長時間使用やプール、花粉・ハウスダストなどでかゆみや充血などを起こすことがあります。こどもロビンアイプラスは、お子さまのデリケートな瞳に優しいしみないさし心地で、目のかゆみ・充血を鎮め、眼病を予防します。

**⚠[使用上の注意]**



**相談すること**

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人：はげしい目の痛み。
  - 次の診断を受けた人：緑内障。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ
- 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - 目のかすみが改善されない場合。
  - 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

～ こんな時、こどもロビンアイプラスをさしてあげてください ～



●水泳のあとの眼病予防に ●スマホ・タブレットのあとの疲れ目に ●花粉などによる目のかゆみ・充血に

**【効能・効果】**

目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

**【用法・用量】** 1回 1～3滴、1日3～6回 点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛などに触れさせないでください(目やにや雑菌などのため、薬液が汚染又は混濁することがあります)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。

## 【成分・分量】

有効成分	含有量 (10mL中)	はたらき
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	30mg	涙の蒸散を防いで目の潤いを保持し、 角膜を外界の刺激から保護します。
グリチルリチン酸二カリウム	8mg	目のかゆみ・疲れ・まぶたのただれ などの症状を起こした目の各種組織 の消炎・修復に有効です。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	1mg	抗ヒスタミン剤の一つで、目のかゆみ、 流涙などの症状をやわらげます。
タウリン	10mg	アミノ酸の一種で、目に栄養を与え 疲れの回復を早めます。

添加物として、クロロブタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、ホウ砂、ホウ酸、エデト酸ナトリウム水和物を含有します。

## 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後は、できるだけ速やかに使用してください。保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとってから使用してください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

<http://www.hisamitsu.co.jp>

久光製薬お客様相談室： ☎0120-133250  
受付時間／9:00～17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

製造販売元 **佐賀製薬株式会社** 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481