

外用殺菌消毒薬

第3類医薬品

イソプロパノール50%P

火気注意 *飲用不可*

Isopropyl Alcohol 50%P

【使用上の注意】



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1) 損傷のある皮ふ。
- (2) 目の周囲、粘膜等。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感

【効 能 効 果】

手指・皮膚の殺菌・消毒

【用 法 用 量】

適量を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に使用してください。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないでください。
- (3) 過度に使用すると、脱脂等による皮ふ荒れを起こすことがあります。
- (4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (6) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (7) 外用にのみ使用してください。

【成 分 分 量】

イソプロパノール (C₃H₈O) 47.7～52.3vol%を含有します。

〈成分に関連する注意〉

アレルギーテストの検査を受ける場合には、本剤を使用していることを医師にお知らせください。(アレルギーテストの検査値に影響をおよぼすことがあります。)

- 【保管及び取扱い上の注意】**
- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 - (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
 - (4) 火気に近づけないでください。
 - (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
 - (6) 薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。（変質又は変色のおそれがあります。）
- 〈貯法〉**
気密容器。火気を避けて室温保存。
- 【包装】** 500mL、5L、16L