

ここから
開けてください

第2類医薬品 開封済み

RAKOOOL 50mL
**ラクビオン
ローション**

2つのかゆみ
止め成分の
W効果!
ジフェンヒドラミン塩酸塩、リドカイン

効能・効果

かゆみ、虫さされ

用途・用法

1日数回、適量を患部に塗布してください。
(用法・用量に関する注意)

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の臨床監督のもとに使用させてください。

(2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水洗またはなるべく速速で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けさせてください。

(3) 本剤は外用のみを使用し、内服しないでください。

(4) 定められた用法・用量を守ってください。

成分・分量(100mL中)

ジフェンヒドラミン塩酸塩 ... 2.0g
リドカイン 0.5g
E-メントール 3.0g
d-カンフル 2.0g
防腐剤: クエン酸、ヒドロキシプロピルセルロース、エタノール、
アジピン酸ジイソプロピル、ハーセナルレチカル、アンモニア



保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼爽の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4)火気には近づけないでください。
- (5)メガネ、時計、アクセサリーなどの金属類、化粧の容器、プラスチック類、床や襖などとの直接接触等に付着すると変色することがありますので、付着しないよう注意してください。
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

ご使用に際し、外箱に記載の説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

1 2つのかゆみ止め成分(ジフェンヒドラミン塩酸塩、リドカイン)のダブル効果

2 E-メントール配合でひんやりして爽快な塗りごこち

3 首曲がり容器なのでどんな部位でも塗りやすい

使用上の注意

△

相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 妊娠やただれのひと。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書をもつて医師または薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状が認められた場合。

発赤部位	症 状
皮膚	炎症・発赤、かゆみ、はれ

(2) 5~6日間使用しても改善がよくならない場合。

販売名 ラクビオンローション

第2類医薬品

副作用被害救済制度の組合せ先
(社)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmdago.jp/kaisouka.html>
電話 0120-149-801, 03-3500-8411

