

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第3類医薬品

ノンステロイド 塗るかゆみどめ

# マキロン<sup>®</sup> かゆみどめ液P

鎮痒消炎薬

## マキロンかゆみどめ液Pの特徴

- ベタつかない、スーツとした使いごちです。
- 殺菌剤イソプロピルメチルフェノールを配合しています。
- ノンステロイドのかゆみどめ液です。



## 使用上の注意



**してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の部位には使用しないで下さい。

- (1)目や目の周囲、粘膜(口唇等)
- (2)傷のある患部



## 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
  - (1)医師の治療を受けている人
  - (2)本人又は家族がアレルギー体質の人
  - (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (4)湿潤やただれのひどい人
- 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
  - (1)使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

## 効能・効果

虫さされ、かゆみ

## 用法・用量

1日1～数回、適量を患部に塗布して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (2)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (3)外用にのみ使用して下さい。

### 《 容器の使い方 》

容器を逆さまに持って、塗布部を数回患部に押しつけ、薬液をラバーに充分浸透させて下さい。

薬液がラバーに充分浸透していないと、ラバーが破れることがありますのでご注意ください。

使用後はラバーの乾燥を防ぐため、必ずキャップをしっかり閉めて下さい。

また、ラバーにクリーム剤や軟膏などの油性成分が付着するとラバーが劣化し、破れることがあります。



## 成 分・分 量

100mL中

成 分	分 量	はたらき
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	かゆみをおさえます。
グリチルレチン酸	0.2g	皮膚の炎症をしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります。
<i>l</i> -メントール	5.0g	清涼感を与え、かゆみをやわらげます。
<i>dl</i> -カンフル	0.1g	

添加物：1,3-ブチレングリコール、クエン酸、クエン酸Na、ヒドロキシプロピルセルロース、エタノール

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)火気に近づけないで下さい。
- (5)車の中など、高温になる場所に放置しないで下さい。容器が変形し、中栓部分の脱落や液もれがおこるおそれがあります。
- (6)本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かしたりすることがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにして下さい。
- (7)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8  
電 話 03(6667)3232  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

マキロンについて詳しくは [www.makiron-s.jp](http://www.makiron-s.jp)

®登録商標



販売元

**第一三共ヘルスケア株式会社**

東京都中央区日本橋小網町1-8

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

製造販売元

**ジャパンメディック株式会社**

富山県富山市横越168