


ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

第②類医薬品

かぜによる のどの痛み・発熱・せきに
総合かぜ薬 **ハヤオキIB**

イブプロフェン + 和漢生薬配合

「ハヤオキIB」は、解熱鎮痛成分イブプロフェンが「つらい熱・のどの痛み」をとまなう“かぜ”にすぐれた効き目を発揮します。
「ハヤオキIB」は、イブプロフェンをはじめ、和漢生薬のカンゾウ、キキョウを含む8種の成分がバランスよくはたらいて、せきや
たん、鼻水、鼻づまりなど、かぜのいろいろな症状を緩和する総合かぜ薬です。



⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の総合かぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の総合かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気があらわれることがあります。)

4. 服用時は飲酒しないでください

5. 5日間を超えて服用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、緑内障、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病
- (9) 次の病気にかかったことのある人。
胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン氏病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消 化 器	悪心嘔吐、食欲不振、胃痛、胃部不快感、口内炎	そ の 他	目のかすみ、耳なり、排尿困難、むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

裏面に続く

肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
腎障害	尿量が減り、全身のむくみ及びこれらに伴って息苦しさ、だるさ、悪心・嘔吐、血尿・蛋白尿等があらわれる。
無菌性髄膜炎	首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、悪心・嘔吐等の症状があらわれる。（このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。）
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）
ぜんそく	

（2）5～6回服用しても症状がよならない場合（特に熱が3日以上続いたり、又熱が反復したりするとき）

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は、増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください 口のかわき、便秘、下痢

【効能又は効果】

かぜの諸症状（のどの痛み、頭痛、発熱、せき、たん、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【用法及び用量】

次の量を、食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2カプセル	3 回
15歳未満	服用しないこと	

【用法及び用量に関連する注意】

（1）用法及び用量を厳守してください。

（2）カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。

（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）

PTPシートの取り出し図



【成分及び分量と働き】1日量（6カプセル）中

成 分		分量	働 き
解 熱 鎮 痛 剤	イブプロフェン	450mg	熱を下げ、頭痛やのどの痛みをやわらげます。
抗ヒスタミン剤	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどを抑えます。
鎮 咳 剤	チベピジンヒベンズ酸塩	75mg	せき中枢に作用し、せきをしずめます。
気管支拡張剤	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
カフェイン剤	無水カフェイン	75mg	頭痛をしずめます。
ビ タ ミ ン 類	ヘスペリジン	90mg	毛細血管の強化作用により炎症を抑えます。
生 薬	キキョウ乾燥エキス	89mg	せきやたんに関与、かぜの回復を助けます。
	（原生薬換算：400mg）		
	カンゾウ乾燥エキス	180mg	せきをしずめ、炎症を抑えて、かぜの回復を助けます。
	（原生薬換算：900mg）		

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、パレイショデンプン、乳糖水和物、結晶セルロース、カルメロースCa、カプセル剤皮に、ゼラチン、酸化チタン、マクロゴール、ラウリル硫酸Naを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先 お問い合わせのお店、または下記にお願いいたします。

薬王製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0744-33-8855
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）