

だい おう かん ぞう とう 大 黄 甘 草 湯 A エキス 細 粒 三 和 生 薬

大 黄 甘 草 湯 A エキス 細 粒 三 和 生 薬 は、漢 方 処 方 「大 黄 甘 草 湯」の 水 製 エキス を 服 用 し や す い 細 粒 に し た も の で す。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|----------------|
| 消 化 器 | はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
4. 5～6日間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の1回量を1日1回就寝前（又は空腹時）に服用。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合をみながら、少しずつ増量（下記の最大量まで）又は減量。

| 年 令 | 1 回 量 |
|-----------|-----------|
| 大人（15才以上） | 0.8g～1.6g |
| 11才～14才 | 0.5g～1.0g |
| 7才～10才 | 0.4g～0.8g |
| 7才未満 | 服用しないこと |

〈用法・用量に関連する注意〉

- * (1) 添付のサジすりきり1杯が約2gです。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品1日量 …………… 1.6g 中
大 黄 甘 草 湯 エキス（1/2 量） …………… 0.8g

| | |
|----------------|------|
| ダイオウ …………… | 2.0g |
| カンゾウ …………… | 0.5g |
| 上記の生薬より抽出したエキス | |

添加物として乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

消費者くすり相談室 TEL 0570-095770

10：00～17：00（土、日、祝日を除く）

適応症

便秘、便秘に伴う頭重・のぼせ・湿疹・皮膚炎・ふきでもの（にきび）・食欲不振（食欲減退）・腹部膨満・腸内異常醗酵・痔などの症状の緩和

〈適応症に関連する注意〉

体力に関わらず、使用できる。



三 和 生 薬 株 式 会 社
栃 木 県 宇 都 宮 市 平 出 工 業 団 地 6-1

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。