

# 下痢止め薬 トメダイニュー錠

下痢はつらく、不快だけでなく、外出するのが気になる、仕事が手につかなくなるなど、日常生活に大きな支障をきたしかねません。

トメダイニュー錠には、ロペラミド塩酸塩をはじめとした5つの有効成分が配合されておりますので、下痢の原因を抑えるとともに、乱れた腸の状態を整え、ストレス・暴飲暴食・細菌感染などによるつらい下痢にすぐれた効果を発揮します。また、腸の過剰な運動による痛みを緩和する成分も配合されており、腹痛をともなう下痢にも対処できます。

下痢でお困りの際は、小さくてのみやすく、においや苦みが気にならないトメダイニュー錠でお早めに対処してください。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください  
本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気があらわれることがあります。)
4. 服用時は飲酒しないでください

### 🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
  - (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。  
(本剤で無理に下痢を止めるとかえって病気を悪化させることがあります。)
  - (4) 便秘を避けなければならない肛門疾患等のある人。  
(本剤の服用により便秘が発現することがあります。)
  - (5) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (6) 授乳中の人。
  - (7) 高齢者。
  - (8) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (9) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状                          |
|-------|------------------------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ                    |
| 消化器   | 便秘、腹部膨満感、腹部不快感、悪心、腹痛、嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい                          |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称              | 症 状  |
|--------------------|--|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。 |

|  |   |
|--|---|
| 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | 高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。 |
| イレウス様症状(腸閉塞様症状)                              | 激しい腹痛、ガス排出(おなら)の停止、嘔吐、腹部膨満感を伴う著しい便秘があらわれる。        |

(2) 2~3日間服用しても症状がよくなる場合

### 効能・効果

下痢、食べすぎ・飲みすぎによる下痢、寝冷えによる下痢、腹痛を伴う下痢、食あたり、水あたり、軟便

### 用法・用量

下記の量を服用してください。ただし、下痢が止まれば服用しないでください。また、服用間隔は4時間以上おいてください。

| 年齢        | 1回量     | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人(15歳以上) | 3錠      | 2回     |
| 15歳未満の小児  | 服用しないこと |        |

<用法・用量に関連する注意>

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) 錠剤の取り出し方: 右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



### 成分・分量(6錠中)

| 成分・分量              | 働き                                       |
|--------------------|--|
| ロペラミド塩酸塩 1.0mg     | 腸の過剰な運動や腸の粘膜における水分の吸収・分泌異常を改善して、下痢を抑えます。 |
| ベルベリン塩化物水和物 80.0mg | 腸内の有害細菌に対して殺菌作用をあらわし、下痢を抑えます。            |
| アクリノール水和物 80.0mg   |  |
| シャクヤク末 200.0mg     | 鎮痛鎮痙作用により、腹痛をやわらげます。                     |
| ゲンノショウコ末 300.0mg   | 腸の粘膜を保護することにより、乱れた腸の状態を整えます。             |

[添加物] 乳糖、セルロース、クロスカルメロースNa、ヒドロキシプロピルセルロース、ケイ酸Ca、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、トリアセチン、タルク、酸化チタン、黄色五号、カルナウバロウ

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) PTPのアルミ箔が破れたり、中身の錠剤が破損しないように、保管及び携帯に注意してください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は服用しないでください。

本製品に関するお問い合わせは  
 興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。  
 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14  
 TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566  
 電話受付時間: 月~金(祝日を除く) 9:00~17:00

Y1280R  
T9K  
061200



 製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14