

効能・効果

腰痛、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、しもやけ

用法・用量

1日1～2回患部に貼付してください。

〈用法・用量に関する注意〉

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(3) 強い刺激を感じることがありますので、入浴の1時間前には本剤をはがしてください。また、入浴後は30分位してから使用してください。(4) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。(5) 皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。(6) 打撲、ねんざ等に本剤を使用する場合は、はれがひいてから使用してください。

成分・分量

成分含量(膏体100g中)
サリチル酸グリコール …………… 2.0g
トコフェロール酢酸エステル …… 1.0g
ℓ-メントール …………… 1.0g
トウガラシエキス …………… 0.3g

添加物として、イソプロピルメチルフェニール、エト酸ナトリウム、グリセリン、ケイ酸アルミニウム、香料、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意


(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。(4) ご使用後は中身の乾燥を防ぐためしっかりとシールを閉めてください。



製造番号
使用期限

袋 : PE, M, PET
シールふた : PP, PET 2E174M

1枚ずつ
取り出しやすい
ポケシップ®



シップの
サイズ
そのまま

Hisamitsu® 10枚入
サイズ:10cm×14cm

外用薬
経皮鎮痛消炎剤

のびのび®
サロンシップ® フィット®H

HELLO! 当社従来品に比べて包装サイズを小さくしました。

フィット®
第3類医薬品

温感

腰痛・肩こり・関節痛などに

シップの端からはがれにくい

丸かど®シップ
▲開け口

薄い・密着
はがれにくいシップ
微香性

詳しい情報は
こちらへ▼

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。
製造販売元 **久光製薬株式会社**
〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地
https://www.hisamitsu.co.jp
お客様相談室：☎0120-133250
受付時間 / 9:00～17:50
(土日・祝日・会社休日を除く)
セルフメタマセーション
税 控除対象

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要に応じてすぐ読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

〈温感〉鎮痛消炎シップ剤

販売名：
のびのび®サロンシップ®フィット®H

10枚入
サイズ：
10cm×14cm

【ご使用方法】○表面のシールを開け口のところから開け、1枚ずつ取り出してお使いください。○中身の乾燥を防ぐため、ご使用後はシールを元のようにつかり閉めてください。

使用上の注意

×してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み、色素沈着

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。