

# KIP

FIRST AID, INSTANT RELIEF FOR MILD BURNS,  
SUNBURNS, CUTS, CHAPS AND CRACKS.

第2類  
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

殺菌消毒消炎薬

軽度のやけど、日やけ、  
切傷、ひび、あかぎれに

# キップ パイロール®-Hi

- キップパイロール-Hiは淡黄白色の軟膏です。
- 軽度のやけど、日やけ、切傷などによく効きます。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 湿潤やただれのひどい人。
- (6) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

〔効 能〕

軽度のやけど、切傷、すり傷、ひび、あかぎれ、かみそりまけ、日やけ、雪やけによる炎症

〔用法・用量〕

疾患の程度により、適量を患部に塗布するか、又はガーゼ等にのばして貼付します。

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

## 〔成分・分量と働き〕 100g 中

成分	分量	働き
イソプロピル メチルフェノール	0.1g	殺菌作用により、細菌による二次感染を防ぎ、治りを早めます。
酸化亜鉛	6.018g	殺菌作用及び消炎作用により、軽度のやけど、切傷及びすり傷に効果をあらわします。
フェノール	0.444g	
サリチル酸	0.056g	

添加物として、パラフィン、サラシミツロウ、ラノリン、サリチル酸メチル、ワセリン、香料を含有します。

## ◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 高温で仮に中味が溶けても流れ出ないように、水平に保管してください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。

## ◎このような時、お使いください

### ★軽度のやけどに

まず冷やします。そのあと塗ってください。皮がむけたり、痛みがある時は、ガーゼ等のにばして患部に貼り、ホウタイをします。

### ★切傷、すり傷に

傷口をきれいにし、そのあと塗ってください。ガーゼ等のにばして、患部に貼り、ホウタイをするのもよいでしょう。

### ★ひび、あかぎれに

患部をお湯できれいにします。そのあとマッサージをするようによくすりこんでください。さらに手袋やソックスで保護するとよいでしょう。

### ★かみそりまけに

ヒゲそり後によくすりこんでください。かみそりまけで痛みのある場合には、うすく、そっと塗ります。

### ★日やけ、雪やけによる炎症に

強い日光に長時間さらすと皮膚は水分を失い、炎症を起こしてヒリヒリ痛んだり、水疱ができます。このような日光による炎症には患部をよく冷やし、そのあとうすく塗ってください。軽度のやけどと同じように、ガーゼ等のにばして患部に貼るのもよいでしょう。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの  
お店又は下記にお願い申し上げます。

キップ薬品株式会社

〒152-0033 東京都目黒区大岡山1丁目34番14号  
TEL 03(3717)3568 FAX 03(3718)7957  
受付時間/9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

キップ薬品株式会社  
東京都目黒区大岡山1丁目34番14号