

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

血清高コレステロール脂質代謝改善

第3類医薬品

スラートンⅢ

パンテチン・大豆由来成分・天然型ビタミンE配合

- スラートンⅢは血液中のコレステロールの代謝を促進するパンテチンに、コレステロールの吸収をおさえるソイステロール、および過酸化脂質(血管のサビ)をおさえるビタミンEを配合した脂質代謝の改善薬です。
- スラートンⅢはコレステロールの高い方によくみられる末梢血行障害が原因の手足の冷え、しびれ等自覚症状を緩和します。
- スラートンⅢはのみやすいソフトカプセルです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
医師の治療を受けている人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談すること
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	恶心、胃部不快感、胸やけ、食欲不振、腹痛、はきけ

(2)1ヵ月服用してもコレステロール値の改善が見られない場合(1ヵ月ほど服用後、医療機関でコレステロール値の測定をすること)
3. 生理が予定より早くたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、医師または薬剤師に相談すること
4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること
下痢、軟便

成分・分量 1日量(6カプセル)中

成 分	分 量	はたらき
パンテチン(80%パンテチン水溶液)	375mg	肝臓においてコレステロールの代謝を促進し、血液中のLDL(悪玉)コレステロールを改善するとともに、末梢組織の余分なコレステロールを肝臓に戻す働きがあるHDL(善玉)コレステロールを改善します。
大豆油不けん化物(ソイステロール)	600mg	大豆からの抽出成分で、小腸におけるコレステロールの吸収を阻害して排泄を促す働きがあり、血液中のLDL(悪玉)コレステロールを改善します。
酢酸d-aトコフェロール(天然型ビタミンE)	100mg	過酸化脂質の生成を抑えることにより、血管をしなやかに保ち末梢の血行障害を改善します。

添加物:ポリソルベート80、サフラン油、ゼラチン、グリセリン、パラベン、酸化チタン、黄色5号

効能・効果

- 血清高コレステロールの改善
- 血清高コレステロールに伴う末梢血行障害(手足の冷え・しびれ)の緩和

用法・用量

次の量を食後に服用する。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	2 カプセル	3回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉(1)用法・用量を厳守すること。

(2)血清高コレステロールの改善には食事療法が大切なので、本剤を服用しても食事療法を行うこと。

保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。なお、服用のつど瓶のフタをしっかりとしめること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)本剤の使用期限は容器および外装に記載してあるので、使用期限内に服用すること。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店又は下記にお願い致します。

<お客様相談室>

☎0744(33)8855

受付時間／9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 薬王製薬株式会社
奈良県橿原市原本町245番地