

第2類医薬品

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

花粉・ハウスダストなどによるくしゃみ・鼻みず・鼻づまりに

アスミン鼻炎薬

トリプル・コントロール

アスミン鼻炎薬は、出てしまった症状を鎮める抗ヒスタミン作用、アレルギー誘発物質の放出を元から抑える抗アレルギー作用、粘膜の炎症を改善し症状が繰り返しこりにくい状態を保つ3つの働きを持つ「ケトチフェンフル酸塩」を配合したお薬です。

抑える 抗アレルギー作用 アレルギーの原因となる 誘発物質を抑えます。

鎮める 抗ヒスタミン作用 ヒスタミン受容体をブロックし、 すでに起こってしまった症状を鎮めます。

改善する 抗炎症作用 粘膜の炎症を改善し、過敏になっている アレルギー症状を抑えます。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) てんかん又はけいれん発作を起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他のアレルギー用薬(皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む)、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある。)

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること(動物実験で乳汁中への移行が認められている。)

5. 服用前後は飲酒しないこと

6. 長期連用しないこと



☒ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 高齢者
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。
- (7) 次の症状のある人。

排尿困難

- (8) 次の診断を受けた人。

気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	紅斑、発疹、浮腫、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛、口内炎
精神神経系	めまい、ふらつき、だるさ、頭痛、味覚異常、しびれ感
泌尿器	頻尿、排尿痛、血尿、残尿感
その他	鼻血、動悸、ほてり、月経異常、体重増加

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
中枢神経症状	一過性の意識消失、けいれん、興奮等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス・ジョンソン症候群)	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
口のかわき、便秘、下痢、眠気

4.次の場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 1週間位服用しても症状がよくならない場合

(2) 症状の改善がみられても服用期間が2週間を超える場合

【効能・効果】 花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり

【用法・用量】 成人(15歳以上)1回1錠、1日2回朝食後及び就寝前に服用してください。

年令	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	1錠	1日2回 朝食後及び就寝前
15歳未満		服用しないこと

〈用法・用量に関する注意〉

1.花粉など季節性のアレルギー性鼻炎による症状に使用する場合は、花粉飛散時期に入って症状が出始めたら、症状の軽い早めの時期からの服用が効果的です。

2.定められた用法・用量(必ず1回1錠、1日2回)を厳守してください。

3.錠剤の取り出し方

図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



【成 分】 1錠中

ケトチフェンフル酸塩 1.38mg(ケトチフェンとして1.00mg)

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、
輕質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

【保管及び取り扱い上の注意】

1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

2.小児の手の届かない所に保管してください。

3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)

4.使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

葉王製薬株式会社 お客様相談室 電話 0744-33-8855

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 葉王製薬株式会社
奈良県磯城郡田原本町245番地