

販売名：へパバイトII

第3類医薬品

【使用上の注意】**相談すること** 1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消化器	胸やけ、吐き気、下痢

製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能又は効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法及び用量】

成人(15才以上)1日1回1本(50mL)服用

●用法及び用量を厳守して下さい。

●本剤はまれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用して下さい。

【成分及び分量】本品1本(50mL)中

肝臓加水分解物 250mg、ビタミン B₆ 5mg、ニコチン酸アミド 25mg、タウリン 1500mg

添加物としてクエン酸 Na、クエン酸、白糖、D-ソルビトール、アセスルファム K、カラメル、バラベン、安息香酸 Na、エタノール、エチルバニリン、グリセリン、バニリン、トコフェロール、プロピレングリコール、香料を含有します。(アルコール含有 0.1mL 以下)

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。

(2)小児の手のとどかない所に保管して下さい。

(3)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。