



服用前にこの説明書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう保管して下さい。

胃腸薬

第2類医薬品

ゼロワン

パンシロン® 錠

**パンシロン® 01** ゼロワン〈錠〉は、飲食後の胃のトラブルを解消し、正常な状態に戻します。芳香性健胃生薬の香味と、丸くて飲みやすい錠剤で手軽に飲めるのが特長です。また、制酸剤・粘膜修復剤・消化剤に、胃の働きを活発にしてくれる「ニンジン末」をプラスし、13種類の有効成分をバランスよく処方しました。

製品の特徴



胃を元気にする

健胃生薬ニンジン末・ケイヒ末 配合

健胃生薬成分が飲み過ぎ、食べ過ぎなどで弱った胃を元気にしてくれます。

飲みやすい

爽やかな味の丸い錠剤タイプ

丸くて飲みやすい錠剤で手軽に飲めるのが特長です。



使用上の注意

❌ **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないで下さい。  
透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。  
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。  
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることもある)
4. 長期連用しないで下さい。



**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 高齢者
  - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
  - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (6) 次の症状のある人 排尿困難
  - (7) 次の診断を受けた人 腎臓病、心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

(2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談下さい。

口のかわき

**その他の注意**

母乳が出にくくなる場合があります。

## ■効能・効果

飲みすぎ、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、胃部不快感、食べすぎ、消化不良、消化促進、食欲不振(食欲減退)、胃弱、胸やけ、胃痛、胃酸過多、げっぷ(おくび)、胃もたれ、胃重、胸つかえ、胃部・腹部膨満感

## ■用法・用量

次の量を食後または食間・就寝前に、水又はお湯で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	3錠	3回
11才以上15才未満	2錠	
11才未満	服用しないこと	

※食間とは……食後2～3時間をさします。

### (用法・用量に関連する注意)

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

## ■有効成分と作用 (9錠中)

	有効成分と配合量	作用
●粘膜修復剤	L-グルタミン……………405mg アルジオキサ……………150mg カンゾウ末……………225mg	L-グルタミンは胃粘膜の再生を、アルジオキサは粘液の増加を促進し、荒れた胃粘膜を修復します。カンゾウ末は胃粘膜の血流の低下を防ぎ、他2つの成分の働きを側面から助けます。
●健胃剤	ケイヒ末……………435mg ニンジン末……………225mg	ニンジン末の食欲不振や弱った胃を改善する働きと、ケイヒ末の健胃作用により食欲を増進します。
●制酸剤	炭酸水素ナトリウム……………1,800mg 炭酸マグネシウム……………450mg 沈降炭酸カルシウム……………240mg	速効性制酸剤で、胃酸をすばやく中和し胸やけやげっぷなどの不快症状を緩和します。
	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム ……………240mg	持続的に胃酸を中和し、胃粘膜を保護します。
	ロートエキス……………30mg	胃液分泌抑制作用があり、制酸剤と組み合わせると胃酸中和効果が持続します。
●消化剤	ビオチン……………90mg プロザイム6……………15mg リパーゼAP6……………60mg	3大栄養素(でんぷん、蛋白、脂肪)に対応する消化剤で胃内容物の消化を助け胃排泄を促進し、胃もたれを改善します。

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、L-メントール、ハッカ油、D-マンニトール、ステアリン酸マグネシウム

## ■保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 湿気により錠剤の表面が変色することがありますので、ぬれた手で触れないで下さい。
- (5) 開封後は、湿気を含むおそれがありますので、瓶の中の詰め物を捨てて下さい。(詰め物は輸送時、錠剤の破損を防止するために入れてあります。)
- (6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないで下さい。  
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用下さい。

### お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

**ROHT** ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

400150509