

この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

後藤散 **かぜ薬**

第②類医薬品

顆粒

後藤散かぜ薬顆粒は、かぜの諸症状に総合的なききめをあらわす成分を配合した、さらさら顆粒タイプのかぜ薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は服用しないでください
(1) 本剤によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
(3) 15歳未満の小児。
(4) 出産予定日12週以内の妊婦。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬(せきどめ)、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗り物酔い薬、アレルギー用薬)
- 服用後、乗り物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気があらわれることがあります。)
- 服用時は飲酒しないでください
- 長期連用をしないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。(高熱、排尿困難)
(8) 次の診断を受けた人。(甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障)
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

(裏面につづく)

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、 顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦し さ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激し い症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困 難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの 諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の 症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、 医師の診療を受けること。)
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等が あらわれる。
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られ
た場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください(口の渇き)

効 能 かぜの諸症状(発熱、頭痛、悪寒、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、せき、たん、のどの痛み、
関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 下記の1回量を、1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	15歳以上	15歳未満
1回量	1包	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>
用法・用量を厳守してください。

成分と作用 1包(1.3g)中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量	作 用
アスピリン (アセチルサリチル酸)	450mg	解熱・鎮痛・抗炎症作用に優れています。 非ピリン系です。
無水カフェイン	50mg	解熱鎮痛の効果を高め、脳の血流を改善 して早く頭痛をなおします。
d0-メチルエフェドリン塩酸塩	10mg	気管支をひろげ、のどを楽にして、激しい せきをしずめます。
ノスカピン	10mg	せきの中枢に作用してせきをしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.5mg	アレルギーなどの症状を緩和し、くしゃみ・ 鼻水・鼻づまりに効果があります。

後藤散かぜ薬顆粒には、上記の有効成分のほかに、顆粒の有用性を高める目的で、
以下の成分が配合されています。

ケイヒ末、カンゾウ末、精製白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、トウモ
ロコシデンプン、炭酸マグネシウム、アルミニウムグリシネート

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。

 **うすき製薬株式会社**
大分県臼杵市市浜997-1

お客様相談室(月～金 8:00～17:00)
 **0120-5103-81**(ゴトーサン、ハイ!)
ホームページ www.gotosan.co.jp