

アレルギー専用眼科用薬 **アレジフェンス®**

特 徴

アレジフェンスは、花粉の季節はもちろん、オールシーズンのアレルギー症状緩和に適した眼科用薬です。

- ◆ 抗アレルギー成分「アシタザノラスト水和物」を配合し、アレルギー症状を引き起こす原因物質(ヒスタミンなど)の放出を抑えることで、症状を緩和します。
- ◆ 防腐剤にベンザルコニウム塩化物を使用していません。
- ◆ 小容量5mL・2本入りなので、持ち運びに便利で、衛生的です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 7歳未満の幼児。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人。
- (5) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人。
- (6) 次の症状のある人。
 はげしい目の痛み
 (7) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。
 とくに次のような場合はアレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師に相談してください。
 - 片方の目だけに症状がある場合
 - 目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合
 - 視力にも影響がある場合
 - 目やにの多い場合

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ*、はれ*、刺激感*、痛み*、なみだ目

*目のまわりを含みます

3. 次の場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 1週間位使用しても症状がよくならない場合。

4. 症状の改善がみられても2週間を超えて使用する場合は、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果


花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和：目のかゆみ、目の充血、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

用法・用量

1回1~2滴、1日4回(朝、昼、夕方及び就寝前)点眼してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目の周囲に流れ出た液はすぐにふきとってください。
- (4)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください(目やにや雑菌等のため、薬液が汚染又は混濁することがあります)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (5)コンタクトレンズの装着液として使用しないでください。また、コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (6)点眼用にのみ使用してください。
- (7)花粉などの季節性のアレルギーによる目の症状に使用する場合は、花粉飛散期に入って症状が出始めたら、症状の軽い早めの時期からの使用が効果的です。



成分・分量

1mL中

成分	分量
アシタザノラスト水和物	1.08mg (アシタザノラストとして1.0mg)

添加物：モノエタノールアミン、イプシロン-アミノカプロン酸、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、クロロブタノール、プロピレングリコール、ポリソルベート80、pH調節剤

保管及び取扱い上の注意


(1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。自動車内や暖房器具の近くなど高温(40°C以上)となる場所に放置しないでください。また過度の低温での保管は避けてください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)他の人と共用しないでください。

(5)使用期限(外箱及びラベルに記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。



■ご相談・お問い合わせ先■

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

わかもと製薬株式会社「お客様相談室」 電話03-3279-1221【直通】

受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)



製造販売元

わかもと製薬株式会社

〒103-8330 東京都中央区日本橋本町二丁目2番2号

<http://www.wakamoto-pharm.co.jp/>

®登録商標