

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

乗物酔い薬

第2類医薬品

ポード



船やバスなどの乗物にゆられて気分が悪くなったり、頭痛やめまい、吐き気等をもよおすことほどつらいものはありません。

ポードは、このような乗物酔いを予防したり、抑制するのに効果のあるすぐれた成分を配合した薬です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - ①医師の治療を受けている人。
 - ②妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - ③高齢者。
 - ④本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - ⑤薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - ⑥次の症状のある人。
排尿困難
 - ⑦次の診断を受けた人。
緑内障、心臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
その他	顔のほてり、排尿困難、異常なまぶしさ

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
口のかわき、便秘

効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

用法・用量

乗物酔いの予防には、乗車船30分前に1回量を服用してください。なお必要に応じて追加服用する場合には、下記用量を4時間以上の間隔をおき服用してください。

1日2回まで服用できます。

1回量	15歳以上	7歳以上 15歳未満	7歳未満
	1瓶(10mL)	1/2瓶(5mL)	服用しないこと

用法及び用量に関する注意

- ①用法、用量を厳守してください。
- ②小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

1瓶(10mL)中

成分	分量	はたらき
スコポラミン臭化水素酸塩水和物	0.22mg	乗物によって起こる感覚の混乱を軽減します。
ピリドキシン塩酸塩	20mg	吐き気やめまいに効果を示します。
クエン酸カフェイン	80mg	眠気を予防し、頭痛を緩和します。

添加物：D-ソルビトール、デヒドロ酢酸Na、香料、エタノール、バニリン

保管及び取り扱い上の注意

- ①服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
- ②直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ③小児の手の届かない所に保管してください。
- ④他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- ⑤使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は次の所にお問い合わせください。

森下仁丹株式会社 お客様相談室

電話 06-6761-0003

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元：**大昭製薬株式会社**
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168

発売元：**森下仁丹株式会社**
大阪市中央区玉造1丁目2番40号