

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

日本薬局方

# ヨクイニン末

第3類医薬品

500g

△ 使用上の注意 (使用前に必ずお読みください)

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】 いぼ、皮膚のあれ

【用法・用量】 次の1回量を1日3回、食前又は食間に服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2g(添付のサジ1杯分)	3 回
15歳未満	服用しないでください	

添付のサジはすり切り1杯約2gです。

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】 1日量(6g)中

日本薬局方 ヨクイニン末 6g

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない所に封をして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを食べたりしないようご注意ください。

本剤のような植物を調整、刻み、粉末にして使用する薬剤は、天然物を用いておりますので、産地・天候・収穫時期等を一定にするのは非常に困難であるため、ロットによりまして色・味・においに多少違いが生じることがあります。

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話0120-149-931(フリーダイヤル)

健栄製薬(株) お問い合わせ先  
電話番号 (06) 6231-5822  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元  
**健栄製薬株式会社**  
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

製造販売元  
**株式会社 杉本天海堂**  
大阪市北区末広町3番21号

紙箱 ♻️ 袋:PE, PET  
スプーン: PS



第3類医薬品

日本薬局方

# ヨクイニン末

Powdered Coix Seed

500g