

ご使用に際してこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

皮膚軟化治療薬 第3類医薬品

【販売名】 近江兄弟社メンタームクリームU20

乾燥肌の手荒れ、カチカチになったかかと、黒ずんでザラザラのひじ・ひざ・くるぶしは、角質層の水分が不足しています。近江兄弟社メンタームクリームU20は、尿素有20%配合し体内にある水分を取り込んで角質層の水分を保持します。またビタミンE(トコフェロール酢酸エステル)とグリチルリチン酸ニカルウムが血行をよくして肌荒れを防止します。

3つの有効成分の働き

尿素 (20%配合)

保湿効果

角質層に水分を引きよせ、お肌のうるおいを保ちます。

ビタミンE


血行促進効果

お肌の血行を促進し、新陳代謝を高めます。

グリチルリチン酸ニカルウム

炎症抑制効果

肌荒れを改善します。



こんな症状に...



水仕事などで
ガサガサの手指



乾皮症で
カサカサの肌



硬く厚くなった
カチカチかかと



黒ずんで
ザラザラの
ひじ・ひざ・くるぶし

⚠️【使用上の注意】

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおおくなりやすくなります)

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位。
- (3) かさがたの様に皮ふがはがれているところ。
- (4) 炎症部位(ただれ・赤くはれているところ)。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬や化粧品等による刺激症状又はアレルギー一症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合
 - (2) 2週間位使用しても症状の改善が見られない場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、かぶれ、刺激性(痛み、熱感、びりびり感)、かさがたの様に皮ふがはがれる状態

【効能・効果】 手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

【用法・用量】 1日数回、適量を患部に塗布してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) (1) 目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用してください。
- (5) 化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧品等の目的で顔面には使用しないでください。

【成分・分量】 100g中に次の成分を含みます。

成分	分量	働き
尿素	20.0g	角質軟化作用(硬くなった皮ふをやわらかくする働き)と保湿作用(皮ふをみずみずしく保つ働き)があります。
グリチルリチン酸ニカルウム	0.5g	皮ふの荒れをしずめます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	血行を促進して、新陳代謝を高めます。

添加物として、セトステアリルアルコール、白色ワセリン、スクワラン、硬質流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、ポリソルベート60、自己乳化型ノステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ジメチルポリシロキサノン、プロピレングリコール、グリセリン、キサンタンガム、トリエタノールアミン、メチルパラベン、プロピルパラベン、その他2成分を含有する。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- (2) 極端な低温・高温・直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります)

製造販売元 株式会社 近江兄弟社
滋賀県近江八幡市魚町元29

お問い合わせ先
株式会社 近江兄弟社 お客様相談室
TEL.0748-32-3135
受付時間:午前9:30から午後5:30まで(土・日・祝日を除く)

90g

MADE IN JAPAN

©32009