

腰痛、筋肉痛、関節痛、ねんざ

経皮吸収型消炎・鎮痛冷感パッピング

第2類医薬品

ラクール
新インペタジm 冷感 6枚入

使用上の注意

【X】してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 次の人は使用しないでください
 - (1) 本剤による過敏症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 15歳未満の小児。
 2. 次の部位には使用しないでください
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) しつしん、かぶれ、傷口。
 - (3) みずむし・たむし等または化膿している部位。
 3. 連続して2週間以上使用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 麻によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 小 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感	

- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

製造番号

使用期限



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

販売名 新インペタジm

■成分・量 霧滴体 100g 中

イソジン・メタシン… 0.5g
添加物として、カオリン、酸化チタン、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポリアクリル酸鈉水溶性中和物、カルボキシビニルポリマー、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、エドテ酸Na、N-メチル-2-ピロリドン、ケイ酸アルミニウム、ポリオキシエチレン硬化ヒマツ油、Z-メントールを含有します。

■効能・効果

腰痛、関節痛、筋膜炎(手・手首の痛み)、肩の痛み(テニス肘等)、筋肉痛、打撲、ねんざ、肩こりに伴う肩の痛み

■用法・用量

プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼ってください。
(用法・用量に過剰する注意)

- (1) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のもの治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (2) 定められた用法・用量をお守りください。
- (3) 針をかいたり、患部がぬれてしまい時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (4) 肌の弱い人は、患部に胸の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を自宅として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼やかな場所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(医薬の原団になったり品質が変わる。)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れて、開口部のファスナーを閉めるかまたは瓶口部をおりまげて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

■用法説明

本剤の使用中に痛みをともなう赤味を帯びた米粒大の水泡があらわれた場合には、ウイルスによる帯状疱疹であることが多く、副作用と間違えられることがあります。このような場合には使用を中止して、皮ふ科専門医の診療を受けてください。

副作用救済制度のお問い合わせ先

(独) 薬業品医療機器総合機構

<電話> 0120-149-931

(フリーダイヤル)

（お問い合わせ先）

本製品に関するお問い合わせは、下記まで
ご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ラクール薬品販売株式会社

フリーダイヤル 0120-86-8998

発売元

ラクール薬品販売株式会社
東京都足立区荒川1丁目9番14号

製造販売元

東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

