

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

【効 能】

かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症)

【用 法】

1日1～数回、適量を患部に塗布してください

(1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください

(2)小児(15歳未満)には使用させないでください

(3)外用にのみ使用してください

【成 分】100g中

尿 素……………20g
 リドカイン……………2g
 ジフェンヒドラミン……………1g
 グリチルレチン酸……………0.3g
 トコフェロール酢酸エステル……………0.5g
 添加物:DL-アラニン、グリシン、クエン酸Na水和物、乳酸、乳酸Na、エデト酸Na水和物、サトウ、ステアリン酸ポリオキシド、パラベン、ミリスチン酸イソノドシル、カルボキシビニルポリマー、β-メントール、香料

【保管および取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください(2)小児の手の届かない所に保管してください(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4)キャップの閉め方が不十分な場合、乳液が乾燥し、ザラザラ感がでることがありますので、ご使用のつどキャップをきちんと閉めてください(5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください

(1)本剤または本剤の成分により過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

2. 次の部位には使用しないでください

(1)目のまわり、粘膜等(2)引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位(3)かさぶたのように皮ふがはがれている所(4)炎症部位(ただれ・赤くはれている所)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ピリピリ感)、はれ、かさぶたのように皮ふがはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

発売元

ラクール薬品販売株式会社
 東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆
 フリーダイヤル 0120-86-8998

製造販売元

三友薬品株式会社
 東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

副作用被害救済制度の問合せ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

こんな症状に効果的です

- お風呂上がりで血行が良くなる
かゆくなる
- 寒さが増し空気が乾燥してくると
かゆくなる
- 衣類の刺激などでかゆくなる

5つの成分が配合されています

尿素20%
うるおい
保湿成分

リドカイン
かゆみ止め
成分

ジフェンヒドラミン
かゆみ止め
成分

水分をとりこみ
皮ふを柔らかくします

局所麻酔剤と抗ヒスタミン剤が
Wでかゆみを抑えます

グリチル
レチン酸
消炎成分

トコフェロール
酢酸エステル
血行促進
成分


皮ふの炎症を
鎮めます

皮ふの新陳代謝を
高めます

皮膚やわらか成分(尿素)などが
うるおいのあるお肌になります



2種類のかゆみ止め成分が
乾燥肌によるかゆみを鎮めます



製造
番号

使用
期限