




結膜囊の洗浄・消毒に

Boric Acid 500g
ホウ酸
眼科用剤 日本薬局方
粉末
第3類医薬品

P

P

第3類医薬品
粉末
眼科用剤 日本薬局方
ホウ酸



外用剤なので飲まないでください

結膜囊の洗浄・消毒に

健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

第3類医薬品
粉末
眼科用剤 日本薬局方
ホウ酸


Boric Acid 500g
【功能効果】 結膜囊の洗浄・消毒
【用法用量】 2%以下の濃度で用いてください。
＜用法用量に関連する注意＞
(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(2)コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
(3)眼科用剤にのみ使用してください。
(4)完全に溶解してから使用してください。
(5)並置したものは使用しないでください。
【成分分量】 1g中 日局ホウ酸 1g含有。
【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
(5)溶かした後は速やかに使用してください。
＜貯法＞ 密閉容器。室温保存。
【希釈方法】
2%液：添付のスプーン1杯(約1g)を水約50mLに溶かしてください。
※添付のスプーン1杯は約1gです。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkou/jisgi.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造番号
使用期限
紙箱
PP袋
PSスプーン袋
PEスプーン袋

mp5-5
2010

第3類医薬品
粉末
眼科用剤 日本薬局方
ホウ酸



外用剤なので飲まないでください

結膜囊の洗浄・消毒に

健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品
粉末
眼科用剤 日本薬局方
ホウ酸

Boric Acid 500g
△使用上の注意
【してはいけないこと】
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 外用にのみ使用し、内服しないでください
2. 長期連用しないでください
【相談すること】
1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4)次の症状のある人。
はげしい目の痛み
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ



4 987286 310978

01 0810