

日本調剤企画  
5COINS  
PHARMA

ビタミンB<sub>1</sub>/B<sub>6</sub>/B<sub>12</sub>主薬製剤

# 眼精疲労 肩こり・腰痛に

6つの優れた有効成分が効く


ビタミンE・γ-オリザノール配合



30錠 第3類医薬品 (10日分)

30錠

開封後はチャックを閉じて保存してください。

切り取り線 

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

販売名: アリナリッチEXハイ

第3類医薬品

ビタミンB<sub>1</sub>B<sub>6</sub>B<sub>12</sub>主薬製剤 30錠

**△使用上の注意**

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、皮膚部に発疹・発赤、かゆみ、消化器部に吐き気・嘔吐、口内炎、胃部不快感の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)服用後、軟便、下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合。(2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。
4. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

**【効能】** 次の諸症状の緩和: 神経痛、筋肉痛、関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、眼精疲労「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」次の場合のビタミンB<sub>1</sub>B<sub>6</sub>B<sub>12</sub>の補給: 肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

**【用法・用量】** 次の量を食後に水又はお湯で、かまずに服用してください。

成人(15歳以上) 1日1回(1回2~3錠)、15歳未満 服用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉用法・用量を厳守してください。

**【成分・分量】** 3錠(1日最大服用量)中 フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB<sub>1</sub>誘導体)109.16mg(フルスルチアミンとして100mg)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>)100mg、シアノコバラミン(ビタミンB<sub>12</sub>)1,500 μg、トコフェロールコハク酸エステルカルシウム(ビタミンE)103.58mg(d $\alpha$ -トコフェロールコハク酸エステルとして100mg)、パントテン酸カルシウム30mg、ガンマーオリザノール10mg 添加物として、乳酸 Ca 水和物、カルメロース Ca、セルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸 Mg、乳糖水和物、ヒプロメロース、白糖、ゼラチン、アラビアゴム、炭酸 Ca、タルク、酸化チタン、リポフラビン、カルナウパロウを含有します。

**【保管及び取扱い上の注意】** (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックを閉めて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。(4)使用期限内に服用してください。

本品についてのお問合せ先  
お客様相談室  
☎0120-18-3548  
月~金曜日(祝日を除く)  
10:00~16:00

日本調剤  
オンラインストア



PE、金属、PET

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931

2308A

使用  
期限

製造 米田薬品工業株式会社  
販売元 奈良県高市郡高取町市尾986

製造  
番号