

りゅうたんしゃかんとう  
**竜胆瀉肝湯 A エキス細粒 三和生薬**

竜胆瀉肝湯Aエキス細粒 三和生薬は、漢方処方「竜胆瀉肝湯」の水製エキスを服用しやすい細粒にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことのある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。

その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症 状 の 名 称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15才以上）	2.0 g
7才～14才	1.3 g
4才～6才	1.0 g
4才未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品1日量 ..... 6.0 g 中  
竜胆瀉肝湯A水製エキス ..... 4.0 g

シャゼンシ ..... 2.1 g	トウキ ..... 3.5 g
オウゴン ..... 2.1 g	サンシシ ..... 0.7 g
タクシャ ..... 2.1 g	カンゾウ ..... 0.7 g
モクツウ ..... 3.5 g	リュウタン ..... 0.7 g
ジオウ ..... 3.5 g	

上記の生薬より抽出したエキス

添加物として乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

\*消費者くすり相談室 TEL 0570-095770  
10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果にはかわりございません。

適応症

体力中等度以上で、下腹部に熱感や痛みがあるものの次の諸症：

排尿痛、残尿感、尿のにごり、こしけ（おりもの）、頻尿



三和生薬株式会社  
栃木県宇都宮市平出工業団地6-1