

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限(パッケージ底面およびチューブ底に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

塗る 肩がこって頭痛がする方に ズッキノン^a軟膏

経皮吸収鎮痛薬

第3類医薬品

販売名:ズッキノン a

製品特徴

1. 頭痛、肩こりを塗って治せる、軟膏タイプのお薬です
2. 肩・首すじに塗るだけで、血行を促進しながら筋肉の緊張をやわらげ、頭痛を治します
3. メントール配合で、スッキリ爽快な塗り心地とともに痛みを鎮めます
4. 直接塗れるドーム型チューブ採用で、手を汚さずに使えます

おすすめの塗り方

頭痛(緊張性頭痛)をやわらげるときは、肩から首すじ、耳の裏にかけて筋肉に沿ってすりこむように塗ってください。

※こめかみ、おでこには塗らないこと
(目に入ることがある)



手を汚さない塗り方のコツ

チューブから直接塗る際は、予めドームの先端に薬剤を出しておき、それを患部に押し付けながら塗り広げてください。
(塗りながら薬剤を出すと、薬剤が出すぎていることに気付かず、肌に薬剤が白く残ってしまうことがあります。)

ドーム先端に
塗る量を
出しておく



⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

1. 目や目の周囲(こめかみなど)、粘膜(口腔、鼻腔、膣など)
2. 湿疹、かぶれ、傷口

相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

- (1) 使用後、次の症状が現れた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮ふ | 発疹・発赤・かゆみ |

- (2) 5~6日間使用しても症状が良くならない場合

効能・効果

頭痛、肩のこり、筋肉痛、神経痛、腰痛、歯痛、ロイマチス、関節痛、打撲、ねんざ

用法・用量

適宜量を取り患部に塗擦してください

<用法・用量に関する注意>

- (1) 使用のつどキャップをしっかりとしめること
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (3) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (4) 外用にのみ使用すること
- (5) 塗擦部位をラップフィルムなどの通気性の悪いもので覆わないこと
- (6) 皮ふの特に弱い方は、同じところに続けて塗布しないこと

成分・分量

100g 中

サリチル酸メチル…12g ラーメントール…6g ユーカリ油…2g

添加物として、テレビン油、ステアリン酸、ステアリルアルコール、モノステアリン酸グリセリン、セチル硫酸Na、プロビレングリコール、トリエタノールアミン、カルボキシビニルポリマー、香料を含有する

<保管および取扱い上の注意>

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問い合わせ先
お客様相談室 ☎ 06(6203)3625
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)
ホームページアドレス <http://pr.kobayashi.co.jp>

製造販売元
小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3
MADE IN JAPAN 10100705