

[効能・効果] みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし
[用法・用量] 1日1回、適量を患部に塗布してください。
(1)定められた用法・用量を守りください。(2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。(3)本剤のついた手で目や粘膜にふれないでください。(4)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。(5)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(6)外用にのみ使用してください。

[保管および取り扱い上の注意]

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(製品の原因になつたり品質が変わることがあります)。(4)使用期限(外箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はなるべく速かに使用してください。(5)容器を横倒しで放置するど中のクリームがキャップ側に偏るのでご注意ください。

ナデーム 水虫プラスHT10 クリーム

第2類医薬品

[相談すること] 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人。(2)乳幼児。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことのある人。(4)患部が膿瘍または広範囲の人。(5)患部が化膿している人。(6)湿疹のかゆみ(皮膚のかゆみ)。(7)妊娠または妊娠している可能性のある人。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 ふ	かぶれ、刺激感、熱感、膿瘍・蕁瘍(フケやアカのように皮膚が剥がれる)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮ふの亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤、かゆみ*、はれ*、じんましん*

*全身に発現することがあります。

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なさに読めるよう大切に保管してください。

[使用上の注意] **[してはいけないこと]**
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起らやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
本剤または本剤の成分によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、はれ等)を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください
(1)目や目の周囲、粘膜(例えば口腔、鼻腔、喉等)、陰のう、外陰部等。(2)湿疹。(3)腫瘍、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

[成分・分量] 1g中
テルビナフィン塩酸塩 … 10mg
尿素…………… 100mg
リドカイン…………… 20mg
ジフェンヒドラミン…………… 10mg
グリチルレチン酸…………… 1mg
添加物 : ベヘン酸、ベヘニルアルコール、セタノール、流動パラフィン、ステアリン酸ポリオキシル、ステアリン酸グリセリン、1,3-ブチレンジリコール、パラベン、ジメチルポリシロキサン、グリシン、DL-アラニン、クエン酸Na水和物、エデト酸Na水和物、pH調節剤、香料