

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

目薬

ロート養潤水α 第3類医薬品

おやすみ前にも  
一滴…。

## 日中、負担をかけた 目の疲れをやわらげます。

「ロート養潤水α」は眠っている間の「休眼時間」に着目しました。4つの栄養成分が、パソコンやコンタクトレンズなどによって、負担をかけた瞳の疲れを癒すと同時に、目やに等を取り除き、目のかすみを改善します。また、ヒアルロン酸ナトリウム(製剤の粘稠剤)配合の“しっとり”目薬です。

# 養う

タウリン

目に栄養を与えると共に、新陳代謝を促進し、疲れた目の回復を促します。

# 潤す

コンドロイチン硫酸  
エステルナトリウム

コンタクトレンズなどによつて負担をかけた角膜の表面を、やさしく保護し、眼病を予防します。

# 水のチカラ

ヒアルロン酸ナトリウム(製剤の粘稠剤)  
美容液などにも使用される、保湿能力に優れた粘性のある成分。

乾燥した部屋で過ごす

コンタクトレンズをはずした後に

朝、目やにが気になる

パソコンによる目の使いすぎ

天然型ビタミンE

目に栄養を与え血行を促進し、目の疲れを効果的に癒します。

L-アスパラギン酸カリウム  
目の細胞の呼吸を促進し、目の疲れを癒します。



18世紀に、日本の医学の振興を目指して翻訳された“解体新書”。その開拓の思想のもとに、ロートは現代人の目の疾患をあらゆる方向から見つめ直しています。現在までに培ってきたノウハウと最新技術で酷使される目に応えたい、その想いを「解眼新書」の文字に託しました。

解眼新書ホームページ <http://www.rclub2.rohto.co.jp/kaigan/>

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる  
**フリーアングルノズル®**



…



…



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

**ワンタッチ式スクリューキャップ**



開ける時は左に1回力チックと回し、閉める時も右に1回力チックと回すだけ。簡単便利です。

## 使用上の注意 !

### 相談すること



1. 次の人は、使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人  
　　はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人  
　　緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

- (2) 目のかすみが改善されない場合

- (3) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

### 効能・効果

目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

### 用法・用量

1回1~3滴、1日5~6回点眼してください。

#### 用法・用量に関する注意

- (1) 用法・用量を厳守してください。なお、就寝より5分以上前の点眼をおすすめします。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。  
〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕  
また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。



目やまつ毛が  
ふれることのないように

### 成 分

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム ..... 0.5%  
タウリン ..... 0.5%  
酢酸d-a-トコフェロール(天然型ビタミンE) ..... 0.03%  
L-アスパラギン酸カリウム ..... 0.5%  
添加物として、ホウ酸、ホウ砂、l-メントール、ユーカリ油、ゲラニオール、ヒアルロン酸Na、塩酸アルキルジアミノエチルグリシン、エデト酸Na、ポリソルベート80、pH調節剤を含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40°C以上)に放置しないでください。
- (2) キャップを閉める際は、カチッとするとまで回して閉めてください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 他の人と共用しないでください。
- (6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとてご使用ください。
- (8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを  
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

**東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230**

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)



ロート製薬株式会社  
大阪市生野区巽西1-8-1

401113701