

開封口

服用の前に、この箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読むよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - (3) 高齢者。
2. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。
- (5) お薬の入っている袋を開封後、3日経過したものは服用しないでください。

販売名：赤玉はら薬

止瀉薬

第2類医薬品

【効能・効果】

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

【用法・用量】

次の1回量を1日3回食前に水又はぬるま湯で服用してください。

15歳以上	1回10粒
11歳以上15歳未満	1回7粒
8歳以上11歳未満	1回5粒
5歳以上8歳未満	1回4粒
3歳以上5歳未満	1回3粒

3歳未満は服用しないでください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤師のどにわたるものではないよう、よく注意してください。
- (3) 定められた用法・用量を厳守してください。



分 包：
PE、PT

下痢
食あたり

赤玉



イメージ図

■18包入
(1包10粒)

第2類医薬品

【成分・分量】1日量(30粒中)

セツリ末	30mg
アクリノール水和物	60mg
タンニン酸ペルペリン	120mg
ゲンノシヨウコエキス	300mg

(本品300mgは原生薬3000mgに相当)
添加物として、炭酸Ca、カルメロースCa、デヒドロ酢酸Na、コメデンプラン、カルメロースNa、バレイシヨゲンザン、タルク、セラックス、マクロゴール、赤色102号、黄色5号を含有します。

発売元

D 大昭製薬株式会社

Daisio 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場68

製造販売元

中央薬品株式会社

富山県富山市西四十物町4-9

中央薬品株式会社 お客様相談窓口

電話 076-493-5010

受付時間 9時～17時(土・日・祝日を除く)

副作用救済制度 電話0120-149-931

