

鎮痛消炎プラスター剤 パスタム[®]FX7 温感

第2類医薬品

【特長】

- フェルピナクを1枚あたり35mg 配合した鎮痛消炎プラスター剤です。
- フェルピナクは痛みに関係する物質(プロスタグランジン)の生成を抑え、肩・腰・関節・筋肉の痛みにすぐれた効き目をあらわします。
- ノニル酸ワニリルアミドのはたらきで、心地よい温感作用をあらわします。
- 微香性で、人前でも気になりません。
- 基布はベージュ色で伸縮性にすぐれ、お肌によくフィットします。
- ライナーが3ピース(中央剥離方式)なので、はりやすい。

⚠【使用上の注意】

❌【してはいけないこと】

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる】

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 今までに本剤によるアレルギー症状(例えば発疹、発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜など。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 今までに薬や化粧品などによるアレルギー症状(例えば発疹、発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹、発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱

(2) 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合

【効能・効果】

関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

【用法・用量】

表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付する。

用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 汗をかいたり皮膚がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
- (4) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (5) 強い刺激を感じることがあるので、入浴の30分以上前にはがしてください。また、入浴後は30分位してから使用してください。
- (6) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上はり、発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (7) 皮膚の弱い人は、同じところに続けて使用しないでください。

【成分・分量】膏体100g中[1枚あたり(7cm×10cm)膏体質量1g]

フェルピナク 3.5g
ノニル酸ワニリルアミド 0.025g
添加物として/-メントール、流動パラフィン、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、その他4成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光や高温をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 誤用をさけ、品質を保証するため、他の容器に入れかえないでください。
4. 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部を折りまげ、きちんと閉めて保管してください。
5. 使用期限(この箱及び薬袋に記載)をすぎた製品は使用しないでください。

【包 装】 (7cm×10cm)

製造販売元



祐徳薬品工業株式会社

佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1

【お客様相談窓口】TEL.0954-63-1320
受付時間9:00～17:00(土、日、祝日は除く)