

40g×5個入

100

1211

ケンエー流腸S40

健栄製薬株式会社

第2類医薬品

2404

CV40-5



KENEI ENEMA S 40

第2類医薬品

グリセリン流腸剤

ケンエー流腸S40

【成分分量】

1個(40g)中 日局 グリセリン 20g含有

添加物：ベンザルコニウム塩化物

【効能効果】

便秘

40g×5個入

第2類医薬品

グリセリン流腸剤

ケンエー流腸S40

40g×5個入



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番9号
電話番号 06(6231)5626

40g×5個入

グリセリン流腸剤

ケンエー流腸S40

40g×5個入

第2類
医薬品



4 987286 304151

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

① 適用しないこと
② 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(流早産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)

③ 高齢者。
④ はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血のある人。
⑤ 心臓病の診断を受けた人。

⑥ 2、2～3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

⑦ 12歳以上1回1個(40g)を直腸内に注入し、それで効果のみられない場合にはさらに同量をもう一度注入してください。

⑧ 12歳以上1回1個(40g)を直腸内に注入し、それで効果のみられない場合にはさらに同量をもう一度注入してください。

⑨ 12歳以上1回1個(40g)を直腸内に注入し、それで効果のみられない場合にはさらに同量をもう一度注入してください。

⑩ 12歳以上1回1個(40g)を直腸内に注入し、それで効果のみられない場合にはさらに同量をもう一度注入してください。

⑪ 12歳以上1回1個(40g)を直腸内に注入し、それで効果のみられない場合にはさらに同量をもう一度注入してください。

⑫ 12歳以上1回1個(40g)を直腸内に注入し、それで効果のみられない場合にはさらに同量をもう一度注入してください。

⑬ 12歳以上1回1個(40g)を直腸内に注入し、それで効果のみられない場合にはさらに同量をもう一度注入してください。

＜用法用量に関連する注意＞

(1) 用法用量を厳守してください。

(2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんしてください。

(3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(4) 注入に際し、無理に挿入すると直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。

(5) 流腸にのみ使用してください。

【便秘しがちな人のために】

1. 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間をきめて一定時間トイレに入るよう心がけましょう。

また、便意をもよおしたときは、がまんせずトイレにいきましょ。

2. 繊維質の多い食物と水分を多くとるように心がけましょ。

(例：野菜類、果物、コンニャク、カンテン、海藻など。)

3. 適度な運動、腹部マッサージなどを行うよう心がけましょ。

4. 早朝、起きがけに冷たい水又は牛乳等を飲むと便意をもよおしやすくなります。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造番号
使用期限

第2類医薬品

ケンエー流腸S40

40g×5個入

副作用報告救済制度の問合せ先
(社) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenichu.html>
電話 0120-149-931 (7時～7時15分)

第2類医薬品

ケンエー流腸S40

健栄製薬株式会社

