



第2類医薬品

ROHTO

## 鎮痒消炎薬 [販売名]メンソレータムADスプレー



### 使用上の注意

■してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）  
次の部位には使用しないこと。  
(1)目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等。(2)傷のあるところ。

#### ■相談すること

1.次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること。  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)本人または家族がアレルギー体質の人。  
(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4)湿潤やただれのひどい人。  
2.次の場合は直ちに使用を中止し、本剤を持って医師または薬剤師に相談すること。  
(1)使用後、次の症状が現れた場合。皮ふ：発疹・発赤・かゆみ、はれ(2)5~6日間使用しても症状がよくならない場合。

[効能・効果] かゆみ、皮フ炎、かぶれ、じんましん、虫さざれ、しつしん、ただれ、あせも、しもやけ

[用法・用量] 1日数回、適量を患部に噴射塗布してください。  
(用法・用量に関する注意)

(1)目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。(3)外用にのみ使用すること。(4)使用前によく振ること。(5)患部まで約10cmの距離で噴霧すること。(6)同じ箇所に連續して3秒以上噴霧しないこと。(7)本剤を直接吸入しないこと。(8)顔に向けて噴霧しないこと。

[成分・分量] :原液1g中  
クロタミトン50mg、リドカイン20mg、ジフェンヒドラミン10mg、グリチルレチン酸2mg  
※添加物としてエタノール、尿素、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ヒドロキシプロピレセルロース、β-メントール、香料、DMEを含有する。

**ステロイド成分を配合していません。**

#### [保管及び取扱上の注意]

(1)直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。(2)小児の手の届かないところに保管すること。  
(3)本剤のついた手で目や粘膜に触れないこと。(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。(5)横向きに使用しないこと。

## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てる。

**高圧ガス:DME**

○暖房器具(ファンヒーター等)の周囲は、温度が上がり破裂する危険があるので置かないこと。

○捨てるときは、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガスを抜き、捨てる。

○プロパンガスは使用していません。

内容量:100mL

火気厳禁 第二石油類 65mL

使用期限:缶底に記載

副作用疾患救済制度の問い合わせ先 0120-149-931



第2類医薬品

お客さま安心サポートデスク TEL.06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1