

かゆみ・虫さされ用薬

プチウナ_{J-F}

第2類
医薬品

この説明文書は本剤とともに保管し、使用の際には、よくお読みください。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと (1) 創傷面。(2) 目や目の周囲、粘膜 (例えば口唇等)。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】 かゆみ、虫さされ **【用法・用量】** 1日数回適量を患部に塗布する。＜用法・用量に関連する注意＞ (1) 用法・用量を守ること。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(4) 外用にのみ使用すること。(5) 薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと。また、ひざの裏やひじの内側等に使用する場合は、皮膚を密着 (正座等) させないこと。 **【成分・分量】** (1mL中) ジフェニドラミン塩酸塩20.0mg リドカイン5.0mg l-メントール30.0mg dl-カンフル20.0mg [添加物] エデト酸Na、クエン酸、ゲラニオール、エタノール **【保管及び取扱い上の注意】** (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 容器が変形するおそれがあるので、車の中など、高温になる場所に長時間放置しないこと。容器の変形により、塗布部の脱落や、液もれがおこるおそれがあるので注意すること。(5) プラスチック類、塗装面等に付着すると変質することがあるので、付着しないように注意すること。(6) 火気に近づけないこと。(7) 使用期限 (台紙及び容器に記載) をすぎた製品は使用しないこと。 **【内容量】** 12mL



＜容器の正しい使い方＞

製造
番号
使用
期限

【使用前】



使用前に、容器の先端を上に向け、手の指などで押して中の空気を抜いてください。(容器が温まり、内圧が高まることにより、薬液が多く出ることがあるので、それを防ぐためです。)

【使用中】



図のように容器を下に向け、先端を患部に軽く押しあてて塗布してください。(先端を患部からはなすと薬液が出なくなります。) 使用後は必ずキャップをしっかりとめてください。

T1600 H8K

8Y160

4

○お問い合わせ先
興和(株)お客様相談センター
TEL 03-3279-7755

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931



製造販売元 **興和株式会社**
東京都中央区日本橋本町三丁目4-14