

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

**ブテナフィン塩酸塩**  
(抗真菌成分)

+

**リドカイン**  
(かゆみ止め成分)

第2類医薬品

# メディータム 水虫スプレー

抗真菌薬 ブテナフィン塩酸塩が患部の角質層に浸透し、1日1回の使用で水虫・たむしの原因菌を効果的に殺菌するとともに、リドカインがかゆみを鎮めます。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください  
本剤による過敏症状（発疹・発赤、かゆみ、浮腫等）を起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください  
(1) 目や目の周囲、顔面、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膈等）、陰のう、外陰部等。  
(2) 湿疹。  
(3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

### 🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。  
(3) 乳幼児。  
(4) 本人または家族がアレルギー体質の人。  
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(6) 患部が広範囲の人。  
(7) 患部が化膿している人。  
(8) 「湿疹」が「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等、他の原因による場合が多い。）
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください  
(1) 使用後、次のような症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、落屑、ただれ、水泡、亀裂

- (2) 2週間位使用しても症状がよくなりえない場合、また、本剤の使用により症状が悪化した場合。

