

ご使用前にこの添付文書を必ずお読みください。
また、必要時にそなえて大切に保管してください。

KN081017
0 4 3 1

第3類医薬品

ネオ カルシューM錠

0 4 3 1

カルシウムは、骨や歯の構成成分として最も重要な栄養成分です。カルシウムが不足すると、血液が酸性になり、体の抵抗力が低下し、疾病を招く要因にもなります。

ネオ カルシューM錠は、1錠中に43mgのカルシウムを含んでおり、日常の食事だけでは摂取不足しがちなカルシウムを発育成長や健康維持に、また、妊娠・授乳期の骨歯の脆弱防止をはかるためにも、必要量を十分補給することが大切です。



⚠ [使用上の注意]

相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。
医師の治療を受けている人。
2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
便秘
3. 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談してください。

[成分] 1日量(15錠) 中

リン酸水素カルシウム水和物	2.55g
乳酸カルシウム水和物	0.15g
クエン酸カルシウム	0.15g
添加物として、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウムを含有します。		

[効能・効果]

- 次の場合の骨歯の発育促進：
虚弱体質、腺病質
- 妊娠・授乳期の骨歯の脆弱防止

[用法・用量]

次の1回量を毎食後水またはお湯でかますに服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	5錠	3回
8歳以上15歳未満	3錠	
5歳以上8歳未満	2錠	
5歳未満の乳幼児	服用しないこと	

<用法・用量に関する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。



[保管および取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。
- (4) ピンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、フタを開けた後はすぐしてください。
- (5) 箱およびピンの「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入し、ピンをこの文書とともに箱に入れたまま保管してください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本製品についてのご相談は、お客様相談窓口までお願い致します。

お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-023520

受付時間 平日9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

兵庫県尼崎市長洲本通2丁目8番27号

皇漢堂製薬株式会社

(08.10.改訂)