

スツとするクール感で痛みを鎮める

注入軟膏

デナンコーハイAX

第②類医薬品

痔疾用薬

抗炎症作用の顕著なヒドロコルチゾン酢酸エステルを始め、有効成分を軟膏状にして、使いやすい注入式容器に入れた痔疾用剤です。

### 痛み・かゆみ

局所麻酔作用のあるリドカインで痛み・かゆみを鎮めます。

### はれ・出血

ヒドロコルチゾン酢酸エステルと酸化亜鉛で、出血を止め、はれを抑え、患部を保護します。

- ご使用の前に入浴又はぬるま湯を用い、ガーゼなどで患部をきれいにしますと、一層効果的です。
- 排便時の痛みが激しい時は、1時間ほど前に注入しておきますと、排便時の痛みをやわらげ、便の通りをよくします。

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) 患部が化膿している人。
2. 長期連用しないこと



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
そ の 他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

## 効能・効果

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

## 用法・用量

適量を取り肛門部に塗布するか、又は15歳以上1回1個を肛門部に挿入し、全量を注入する。1日2回まで使用できます。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないこと。

### 〈用法及び用量に関する注意〉

- (1) 小児には使用させないこと
- (2) 肛門部にのみ使用すること





## 成分と働き

成分 1個(2.0g)中	作用
ヒドロコルチゾン酢酸エステル… 5.0mg	抗炎症作用
リドカイン…………… 60.0mg	鎮痛・鎮痒作用
トコフェロール酢酸エステル… 50.0mg	血流改善作用
酸化亜鉛…………… 100.0mg	収れん・保護作用
アラントイン…………… 20.0mg	組織修復作用
ℓ-メントール…………… 10.0mg	清涼感
添加物として、サラシミツロウ、流動パラフィン、スクワラン、オリーブ油、ワセリンを含有します。	

### 〈保管及び取り扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

## 使用方法及び治療のポイント

<p>①キャップを静かにはずしてください。</p> 	<p>②すべりをよくするため薬剤を少量出して先端部に塗ってください。</p> 	<p>③肛門に深く挿入し、容器内の薬剤が十分に注入されるように強く押し出してください。</p>  <p>なるべく深く挿入して下さい。</p> <p>内部に注入する場合</p>	<p>④適量を直接患部に塗るか、ガーゼなどにのぼして患部にあててください。</p>  <p>ガーゼ</p> <p>外部に塗布して使用する場合</p>
---	--	---	---


- 注入式のため、容器の中に少量残りますが、残量を見込んで薬剤は十分充填しており、必要量は、肛門内に注入されます。又、寒い時期、容器が多少硬くなりますが、手の中で暖めると出やすくなります。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの店または下記までご連絡ください。

〒656-1501 兵庫県淡路市尾崎 859 ムネ製薬株式会社  
消費者相談窓口 電話 0120-85-0107

製造販売元 株式会社 雪の元 本店  
奈良県橿原市大谷町182番地

1101-ZZZ

発売元  ムネ製薬株式会社  
兵庫県淡路市尾崎 859

970072-A

## 包装

10個入、20個入、30個入  
(1個ずつシール包装)

## 特長

**効きめが速い** 軟膏状の薬剤が直接患部にとどき、効きめが速くあらわれます。

**2通りの使い方** 患部が肛門内部(内痔)の場合は注入、患部が肛門外部(外痔)の場合は塗布してください。

**衛生的** 注入部が細く、スムーズに手を汚さずに自分で注入できます。

## 養生訓

1. 毎日入浴する。(患部の清潔と血行の改善)
2. 野菜、海草等繊維の多い食事にする。  
(便の量を増やし便をやわらかくし、便通を改善)
3. 香辛料は控えめにする。  
(排便時に患部を刺激する)
4. 深酒をつつしむ。  
(肛門に負担をかけ、患部のうっ血をまねく)
5. トイレは3分以内にすませ、あと必ず清拭する。