

この説明書は、使用前によくお読みください。
なお、使用が終わるまで大切に保管してください。

第②類医薬品

鎮咳去痰薬

せき・たん・ぜんそくに

六活AN錠

ロ ッ カ ッ

六活AN錠は、気管支拡張作用（ぜんそくに効果）および非麻薬性鎮咳作用を有するdl-メチルエフェドリン塩酸塩、せきに有効なナンテンシツ乾燥エキス、たんにも有効なグアヤコールスルホン酸カリウム、カンゾウ末、パイモ末、セキサンエキスが配合され、せき・たん・ぜんそくによく効く薬です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
（眠気があらわれることがあります。）
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

□のかわき

【効能・効果】

せき、ぜんそく、たん

【用法・用量】


次の量を1日3回食後服用してください。

年 齢	1回量	年 齢	1回量
15歳以上	2錠	5歳以上8歳未満	0.5錠
8歳以上15歳未満	1錠	5歳未満	服用しないでください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)錠剤の取り出し方（PTP包装の場合）

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押しつけて裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



【成分・分量と作用】

1日量（6錠）中

成 分	分 量	作 用
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支をひろげて、ぜんそくをしずめ、せきにも効きます。
サリチル酸ジフェンヒドラミン	81mg	ヒスタミンの遊離をおさえることによって、アレルギーによる気管支ぜんそく等に有効です。
無水カフェイン	150mg	脳の神経を興奮させて、眠気や倦怠感に効きます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	204mg	気道粘液の分泌をたかめ、粘りついているたんをうすめて、はき出しやすくします。
カンゾウ末	200mg	気道粘液の分泌をたかめ、たんをはき出しやすくします。また、炎症部の刺激を減少させ、せきをしずめる作用もあります。
ナンテンジツ乾燥エキス (原生薬換算量：1350mg)	135mg	知覚神経や運動神経の末梢に対してマヒ作用があり、ぜんそくなどのせき止めに効果をあらわします。
セキサニエキス (原生薬換算量：200mg)	25mg	二種類のアルカロイド「リコリン」と「セキサニン」が含まれ、たんをとる作用を有しております。
パイモ末	200mg	数種類のアルカロイドが含まれており、漢方として、せき止め、たん切り等の治療に用います。

添加物として、タルク、ステアリン酸Mg、クロスCMC-Na、バレイシヨデンブ、乳糖水和物、リボフラビンを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は生薬が配合されている製品ですので、製品によって錠剤の色が多少異なることがあります。また、錠剤の表面に斑点等が見られる場合がありますが、異物や変色ではなく生薬成分ですので効果には変わりはありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して（瓶入り包装の場合）保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

本剤をご使用になられて、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡頂きますようお願い致します。

福地製薬株式会社

TEL：0748-52-2323

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元
福地製薬株式会社
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824