

この説明文書は本剤とともに保管し、  
服用の際には、よくお読みください。



## 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。

2. 短期間の服用にとどめ、連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 胃腸の弱い人。

(4) 発汗傾向の著しい人。

(5) 高齢者。

(6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

(7) 次の症状のある人。

むくみ、排尿困難

(8) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

## ■ 効能・効果

風邪のひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、身体のふしぶしが痛い場合の次の諸症：感冒、鼻かぜ

## ■ 用法・用量

下記の量を食前又は食間によく振ってから服用する。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満の小児	服用しないこと	

● 食間とは「食事と食事の間」のことで、たとえば朝食と昼食の間のことをさします。食事中に服用するというものではありません。

## 〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法・用量を厳守すること。

(2) 本剤は生薬成分配合のため、沈殿を生じることがあるので、服用の際にはビンをよく振ること。

## ■ 成分・分量(90mL中)

本品90mL(30mL×3本)中、以下の生薬より抽出した麻黄湯エキス81mLを含有する。

マオウ 5.0g ケイヒ 4.0g キョウニン 5.0g カンゾウ 1.5g  
〔添加物〕白糖、パラベン、香料、エタノール、プロピレングリコール

## ■ 保管及び取扱い上の注意

(1) 高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

(4) 使用期限(外箱及びラベルに記載)をすぎた製品は服用しないこと。

(5) ビンをあけたら飲みきること。

(6) ビンをあけたまま保存しないこと。

製造 興和株式会社  
販売元 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14