


医薬品を正しく購入するための **説 明 文 書** 使用前には必ず添付文書を読んで下さい

名称	デイトナS
----	-------

第②類 医薬品

成分・分量	<p>1日量(2カプセル)中 ジフェンヒドラミン塩酸塩 50mg</p> <p>添加物として、クロスポビドン、グリセリン脂肪酸エステル、サラシミツロウ、小麦胚芽油、コハク化ゼラチン、濃グリセリン、酸化チタン、黄色三二酸化鉄を含有しています。</p>
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



用法・用量	<p>寝つきが悪い時や眠りが浅い時、下記の1回量を1日1回、就寝前に服用してください。</p> <p>大人(15才以上) 2カプセル</p>
-------	------------------------------------------------------------------------

効能・効果	一時的な不眠の次の諸症状の緩和:寝つきが悪い、眠りが浅い
してはいけないこと	<ol style="list-style-type: none"> 次の人は服用しないでください。 <ol style="list-style-type: none"> 妊婦又は妊娠していると思われる人 15才未満の小児 日常的に不眠の人 不眠症の診断を受けた人 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。 他の催眠鎮静薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬) 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気をもよおして事故を起こすことがあります。また、本剤の服用により、翌日まで眠気が続いたり、だるさを感じる場合には、これらの症状が消えるまで、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。) 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合には授乳を避けてください。 服用時は飲酒しないでください。 寝つきが悪い時や眠りが浅い時のみの服用にとどめ、連用しないでください。
次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい	<ol style="list-style-type: none"> 医師の治療を受けている人 高齢者(高齢者では眠気が強くあらわれたり、また、反対に神経が高ぶるなどの症状が現れることがあります。) 本人又は家族がアレルギー体質の人 薬により、アレルギー症状を起こしたことがある人 次の症状のある人:排尿困難 次の診断を受けた人:緑内障、前立腺肥大
その他	