

使用前にこの説明文書を必ずお読みください。
又、必要な時に読めるよう保管してください。

グリチルレチン酸(甘草抽出成分)配合

デナンコーマイルド

第2類医薬品

注入軟膏

痔疾用薬

抗炎症作用のあるグリチルレチン酸を始め、5種類の有効成分を軟膏状にして、使いやすい注入式容器に入れた痔疾用薬です。

痛み

局所麻酔作用のあるリドカインで痛み・かゆみを鎮めます。

血行改善

トコフェロール酢酸エステルで血行をよくし、酸化亜鉛で患部を保護します。

はれ

抗炎症作用のあるグリチルレチン酸で、はれを抑えます。

- ご使用の前に入浴又はぬるま湯を用い、ガーゼなどで患部をきれいにしますと、一層効果的です。
- 排便時の痛みが激しい時は、1時間ほど前に注入しておきますと、排便時の痛みをやわらげ、便の通りをよくします。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
次の人は使用しないこと
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発 疹・発 赤、かゆみ、はれ
そ の 他	刺 激 感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

塗布の場合：

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血・ただれの緩和

注入の場合：

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

包装

10個入

(1個ずつシール包装)

用法・用量

〔注入する場合〕

容器先端部を肛門部に挿入し、全量をゆっくり注入してください。

または

〔塗布する場合〕

適量を肛門部に塗布してください。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないでください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 肛門部에만使用してください。
- (3) 肛門内に注入する場合、容器先端部分のみを挿入してください。

年齢	1回量	使用回数
成人(15歳以上)	1個	1日1~3回
15歳未満	使用しないこと	

年齢	1回量	使用回数
成人(15歳以上)	適量	1日1~3回
15歳未満	使用しないこと	

成分・分量と作用

成分	1個(2.5g)中	主な働き
リドカイン	60.0mg	局所の痛み、かゆみをしずめます。
酸化亜鉛	250.0mg	収れん・止血作用により、患部を保護します。
アラントイン	20.0mg	修復作用により、治りを早めます。
グリチルレチン酸	10.0mg	抗炎症作用により炎症、腫れを抑えます。
トコフェロール酢酸エステル	50.0mg	抹消血液循環を改善します。

添加物として、サラシミツロウ、ミリスチン酸イソプロピル、流動パラフィン、ワセリンを含有します。





養生訓

1. 毎日入浴する。(患部の清潔と血行の改善)
2. 野菜、海藻等繊維の多い食事にする。(便の量を増やし便をやわらかくし、便通を改善)
3. 香辛料は控えめにする。(排便時に患部を刺激する)
4. 深酒をつつしむ。(肛門に負担をかけ、患部のうっ血をまねく)
5. トイレは3分以内にすませ、あと必ず清拭する。

〈保管及び取り扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

使用方法及び治療のポイント

① キャップを静かにはずしてください。 	② すべりをよくするため薬剤を少量出して先端部に塗ってください。 	③ 肛門に深く挿入し、容器内の薬剤が十分に注入されるように強く押し出してください。 内部に注入する場合  なるべく深く挿入して下さい。	④ 適量を直接患部に塗るか、ガーゼなどにのびして患部にあててください。 外部に塗布して使用する場合  ガーゼ
---	---	---	--


● 注入式のため、容器の中に少量残りますが、残量を見込んで薬剤は十分充填しており、必要量は、肛門内に注入されます。又、寒い時期、容器が多少硬くなりますが、手の中で温めると出やすくなります。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

ムネ製薬株式会社 〒656-1501 兵庫県淡路市尾崎 859

消費者相談窓口 電話 0120-85-0107

製造販売元 株式会社 雪の元 本店
奈良県橿原市大谷町182番地

発売元  ムネ製薬株式会社
兵庫県淡路市尾崎 859