

日本薬局方

無水エタノール

無水エタノール「コザカイ・P」

(無水アルコール)

Anhydrous Ethanol
500mL



発売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷 3-14-16

製造販売元
小堺製薬株式会社
東京都墨田区両国 4-34-5

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。

使用上の注意

☒ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる]

1. 軽くぬるだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。(局所刺激作用があるため。)
2. 次の部位には使用しないこと。
目や目の周囲、口唇等の粘膜の部分

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 深い傷やひどいやけどの人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品をもって医師又は薬剤師に相談すること。
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発赤、はれ、灼熱感等

- (2) 5～6日間使用しても症状が良くならない場合

効能・効果

創傷面の殺菌・消毒

用法・用量

本品を精製水でうすめて、エタノールとして76.9～81.4vol%とし、これを脱脂綿、ガーゼ等に浸して軽く塗布する。

用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法を厳守すること。
- (2) 外用にのみ使用し、内服しないこと。
- (3) 目に入らないように注意すること。
万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 同一部位にくり返し使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- (5) 広範囲または長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- (6) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること。

火気厳禁、アルコール類、危険等級Ⅱ、水溶性

使用期限：

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931



C09-FL ガラス:瓶

製造番号：

成分

エタノール99.5vol%以上を含む。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光及び火気避け保管すること。
- (3) 揮発性であるので、使用後は密栓し、高温の場所には保管しないこと。
- (4) 他の容器に入れかえないこと。
- (5) 本液はニス溶かすので、ニスの塗ってある建具や家具等には本液が付着しないように注意すること。

