

この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

生薬配合 後藤散 せきどめ

第②類医薬品

後藤散せきどめは、さらさら顆粒タイプのせきどめ薬です。咳を鎮める成分と、痰をやわらかくして吐き出しやすくする成分を配合し、のどをスーッとさせる爽やかな後味です。



❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください
本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗り物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬。
3. 服用後、乗り物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。(高熱、排尿困難)
(8) 次の診断を受けた人。(心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害)
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。

(裏面につづく)

皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
---	---

(2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください(口の渇き)

効 能 せき、ぜんそく、たん

用法・用量 下記の1回量を、1日3回食後に服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	15歳以上	11~14歳	8~10歳	5~7歳	3~4歳	3歳未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分と作用 1包(1.3g)中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量	作 用
カンゾウ(甘草)末	300mg	せきをしずめ、痰を出しやすくします。抗炎症作用があります。味は甘く、薬の服用をスムーズにします。
dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩	25mg	気管支をひろげ、のどを楽にして、激しいせきをしずめます。
ノスカピン	20mg	せきの中枢に作用してせきをしずめます。
リゾチーム塩酸塩	20mg (力価として)	のどのはれ、痛みをやわらげます。又、のどにからんだ痰をやわらかくし、吐き出しやすくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	4mg	くしゃみなど、アレルギー性のせきに効果があります。
無水カフェイン	50mg	

後藤散せきどめには、上記の有効成分のほかに、顆粒の有用性を高める目的で、以下の成分が配合されています。

ℓ-メントール、精製白糖、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。