

2014年10月改訂(第6版)※  
2013年10月改訂

必ずこの説明書をお読み  
になってからご使用くだ  
さい。また、必要なときに  
読めるように大切に保管  
してください。

区分	一般用医薬品
日本標準商品分類番号	872615
承認番号	21500APZ00937000
薬価収載	未収載

貯法	室温保存
	火気を避けて保存
使用期限	個包装に記載

外皮用殺菌消毒剤

第3類医薬品

# ステリコット<sup>®</sup> α

エタノール含浸綿

## 【使用上の注意】

### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
次の部位には使用しないでください。

- (1) 損傷のある皮膚。
- (2) 目の周囲、粘膜等。

[ 損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有するため。 ]

### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

### その他の注意

本剤の使用により、アレルギーテストの判定に影響を及ぼすことがあります。

## 【効能又は効果】

手指・皮膚の殺菌、消毒。医療機器の消毒。

---

### 【用法及び用量】

袋からエタノール含浸綿を取出し手指・皮膚又は医療機器を拭き取ってください。  
使用したものは、すぐに廃棄してください。

#### <用法及び用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意してください。
- (5) 広範囲に使用する場合などには、気化したアルコールの吸引に注意してください。
- (6) 本剤は引火性があるため、火気(電気メス使用等を含む)には十分注意してください。
- (7) アルコール分がタンパク質を凝固させるので、医療機器等を清浄する際は血清、膿汁等を十分に洗い落としてから使用してください。

### 【成分及び分量】

薬液100mL中

有効成分	日局エタノール……………84.2mL
溶剤	日局イソプロパノール……………3.7mL
溶剤	日局精製水……………適量
担体	医療脱脂綿

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 火気に近づけないでください。
- (4) 脱脂綿に小さな黒色又は黄色の斑点がある場合がありますが、これは綿花の葉や種子の一部で、変色したもの等ではありません。
- (5) 薬液は浸潤していても、脱脂綿の端部分等が、白く乾燥しているように見える場合があります。
- (6) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。

お客様相談窓口 TEL 06-6943-8956  
(10:00～17:00 月～金 ただし祝祭日を除く)

### 【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】※

川本産業株式会社  
大阪府中央区谷町2丁目6番4号

---

®＝登録商標