

第②類
医薬品

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように大切に保存して下さい。

便秘薬 センナダイオウ錠シンワ

生薬そのまま、自然なお通じが得られます。

【使用上の注意】

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避け
て下さい。
3. 大量に服用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに
服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に
相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

- *3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続
又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付
文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【成分・分量】6錠中

「日局」センナ末……………900mg 「日局」ダイオウ末……………450mg
なお、添加物としてステアリン酸Mg、無水ケイ酸、クロスカルメロー
スNa、セルロースを含みます。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により、尿が黄褐色又は赤褐色になることがあります。こ
れはセンナ及びダイオウの成分によるものであり、異常ではありません。

【効能・効果】便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出
物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

【用法・用量】朝夕の空腹時に服用して下さい。

ただし、便秘の症状には個人差がありますので、初回は
最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増
量又は減量するようにして下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1~3錠	2回
15歳未満	服用しないで下さい	

※用法・用量を厳守して下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して
下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が
変わることがあります)。
- (4) 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少
の差異が出る場合がありますが、効果には変わりありませんの
で安心して服用して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

***【お問い合わせ先】 伸和製薬株式会社 情報管理室
〒116-0003 東京都荒川区南千住5丁目17番8号
電 話：03(3807)3780
受付時間：9時から17時まで(土・日曜、祝日を除く)

***発 売 元 伸和製薬株式会社
東京都荒川区南千住5丁目17番8号

製造販売元 大峰堂薬品工業株式会社
奈良県大和高田市根成柿574番地